

کتابچه دارویی

مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی طالقانی

دفتر بهبود کیفیت ۱۳۹۱



تهیه کننده: واحد آموزش

فهرست کتابچه

شماره صفحه	نام دارو	شماره صفحه	نام دارو
۲۳	دکزا مزون	۳	آمیگاسین
۲۳	دیگلوفناک	۳	ایزوفلوران
۲۴	دوبامین	۴	ایندومتاسین
۲۴	رائی نیدین	۴	آمنوفیلین
۲۵	سپروفلوکساسین	۵	اریترومایسین
۲۵	سنتازیدیم	۵	آبروین سولفات
۲۶	سفریکسون	۶	ایزوسورباید دی نترات
۲۶	سالیتامول	۶	ایپی نفرین
۲۷	سفتی زوکسیم	۷	اکسی بوتینین
۲۷	سنازولین	۷	اکسازپام
۲۸	سفالکسین	۸	آتاکوریوم
۲۸	فتی تونین	۸	ایزونیازید
۲۹	فتوباربتال	۹	آلبومین (انسانی)
۲۹	فلومازینیل	۹	انسولین
۳۰	فتانتیل	۱۰	آ - ت - آ
۳۰	کاپتوبریل	۱۰	برم هگزین
۳۱	کارپامازین	۱۱	البرازولام
۳۱	کلرفنیل آمین	۱۱	اسید فولیک
۳۲	کتامین	۱۲	استامینوفن
۳۲	کلسیم گلوکونات	۱۲	استازولامید
۳۳	کلین کلامید	۱۳	بیزاکوئیدیل
۳۳	لیدوکائین	۱۳	مارکائین
۳۴	متوکلورامید	۱۴	ایپوروفن
۳۴	مولتی ویتامین	۱۴	باکلوفن
۳۵	مانیتول	۱۵	توفیلین
۳۵	متادون	۱۶	ب - کیپلکس
۳۶	مرفن	۱۶	بنتامازون
۳۶	مترونیدازول	۱۷	بای پیریدین
۳۷	متفورمین	۱۷	پرازوسین
۳۷	میمازولام	۱۸	پروپرانولول
۳۸	متیل پردنیزولون	۱۸	پندین
۳۸	نیتروگلوسیرین	۱۹	پیروکسیکام
۳۹	نالوکسان	۱۹	پروپرفول
۳۹	نور تیامتین	۲۰	پرومتازین
۴۰	وارفارین	۲۰	تراساکلین
۴۰	وانکوماسین	۲۱	تریامترون
۴۱	هالوپریدول	۲۱	جتناسین
۴۱	هیدروکلروتیازید	۲۲	دایمتیکون
		۲۲	دیازپام

امیکاسین**(نام تجاری: Amikin)**

گروه دارویی: آمینو گلیکوزیدها

گروه درمانی: آنتی بیوتیک

شکل دارویی: آمپول ۱۰۰ و ۵۰۰ میلی گرمی

مصرف در دوران حاملگی: گروه D

موارد مصرف: عفونت های خطرناک دستگاه اداری ، استخوان ، پرده مغز و دستگاه تنفس

میزان مصرف: روزانه ۱۵ میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن از راه عضلانی یا انفوزیون وریدی با ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلی لیتر سرم و دکستروز ۵٪ رقیق شده و در مدت ۳۰ تا ۶۰ ثانیه انفوزیون شود (سه بار در روز) .

موارد مانع: حساسیت به داروهای گروه آمینو گلیکوزیدها ولی در نارسایی کلیه و وزوز گوش و کاهش شنوایی و مبتلایان به پارکینسون و کاهش کلسیم و کودکان و سالمندان با احتیاط مصرف شود.

عوارض جانبی: مشکل عضلانی و مهار تنفسی ، مشکلات شنوایی و نارسایی کلیه

توجهات: مشکل و اختلال تنفسی ممکن است بروز نماید . در زمان تزریق ، محلول باید شفاف باشد . بیمار پس از دوره درمانی و حین آن از نظر کلیه و شنوایی آزمایش شود.

آموزش: در صورت هر گونه سرگیجه و اختلال شنوایی به پزشک اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: در دمای ۱۵ تا ۳۰ درجه نگهداری شود.

ایزوفلوران**(نام تجاری: Florane)**

گروه دارویی: هالوژن ها

گروه درمانی: داروهای بیهوشی

شکل دارویی: گاز

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: بیهوشی عمومی یا سرپایی و در تشنج های که به هیچ درمان داروی پاسخ نمیدهد کاربرد دارد.

میزان مصرف: با غلظت ۵٪ در اکسیژن یا N2O

موارد مانع: به علت حساسیت دارویی به ویژه در کسانی که استعداد هیپرترمی بدخیم دارند ممنوع است.

عوارض جانبی: مهمترین مشکل هیپرترمی بدخیم است ولی اختلالات کلیوی و کبدی ممکن است بروز کند ، درد عضلانی ، کاهش فشار خون و اختلالات تنفسی از جمله عوارض دارو است.

توجهات: ضعف عملکرد قلبی از جمله عوارض است که باید مراقب بود.

آموزش: بیمار باید اطلاعات دارویی و پزشکی خود را برای ثبت در تاریخچه به پزشک ارائه نماید.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.

ایندومتاسین**(نام تجاری: Indocid)**

گروه دارویی: اسید استیک (ضد درد غیر استروئیدی)

گروه درمانی: ضد درد ، ضد التهاب

شکل دارویی: قرص ، کپسول ، شیاف

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: در درمان دردهای خفیف تا متوسط ، تب ، ضد التهاب در بیماری های التهابی و رماتیسمی ، در آرتروز ، تورم مفاصل

میزان مصرف: ۵۰ تا ۱۵۰ میلی گرم روزانه که در چند وعده تجویز می شود.

موارد مانع: خونریزی حاد گوارشی ، آسم و حساسیت شدید دارویی

عوارض جانبی: سردرد ، سرگیجه ، سبکی سر ، خونریزی معده ، عوارض کلیوی ، زردی ، مشکلات خونی

توجهات: بیماران ممکن است دچار زردی شوند و ادرار آنها شیبز شود که می بایست دارو را قطع کرد و تست های کبدی انجام داد.

آموزش: آزمایش های کنترل عملکرد کبدی و کلیوی انجام شود. دارو باشیر یا شربت آلومینیوم میل شود. قرص نباید جویده شود.

این دارو در زمان درد های قاعدگی استفاده شود.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.

آمینوفیلین**(نام تجاری: Amoline)**

گروه دارویی: مشتقات گزانتین

گروه درمانی: یاز کننده ریه (برونش) ، ضد آسم

شکل دارویی: تزریقی

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: آسم ، تنگی راههای هوایی ، نارسایی احتقانی قلب و توقف تنفسی (آپنه) نوزادان

میزان مصرف: یک میلی گرم به ازای هر کیلوگرم و در سالمندان ۰,۶ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم به صورت انفوزیون وریدی

موارد مانع: حساسیت مفرط به گروه گزانتین ها ، نا منظمی قلبی ، کاهش کارکرد تیروئید (هیپوتیروئیدی) ولی در بیماران مبتلا به

نارسایی کبدی ، بیمار دیابت قندی ، گلوکوم و فشار خون و زخم معده و روده با احتیاط مصرف شود.

عوارض جانبی: افزایش ضربان قلب ، لرزش دست ، تشنج ، ایست قلبی

توجهات: نباید دارو سریعاً افوزیون شود زیرا باعث ایست قلبی می شود . در صورت تغییر رنگ نباید مصرف شود. در صورت

افزایش ضربان قلب به پزشک اطلاع دهید زیرا نشانه مسمومیت داروی است .

آموزش: بیماران باید استعمال سیگار را قطع کنند. همزمان مصرف نوشابه و غذا های حاوی گزانتین ممنوع است.

شرایط نگهداری: در دمای ۱۵ تا ۳۰ درجه نگهداری شود.

اریترومايسين**(نام تجاری: Erythrocin)**

گروه دارویی: مارکولیدها

گروه درمانی: آنتی بیوتیک

شکل دارویی: قرص، آمپول، شربت

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: عفونت دستگاه تنفس، گلو، گوش، عفونت ریوی، سیاه سرفه، عفونت های لگنی، اورتریت غیر گونوکوکی، تب رماتیسمی

میزان مصرف: یک قرص هر ۶ ساعت یا ۲ قرص هر ۱۲ ساعت

موارد مانع: حساسیت شدید دارویی، نارسایی کبدی

عوارض جانبی: تهوع، استفراغ، اشتهال، مشکلات شنوایی، کهیر، مشکلات قلبی و کبدی

توجهات: در حساسیت به گروه پنی سیلین ها اریترومايسين جایگزین مناسبی است.

آموزش: به منظور کاهش عوارض گوارشی دارو با غذا میل شود. عوارض کبدی دارو طی چند هفته ظاهر می شوند. به همراه آن نباید آب میوه استفاده شود.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.

آتروپین سولفات**(نام تجاری: Atropin)**

گروه دارویی: گروه آنتی کولینرژیک ها

گروه درمانی: ضد برادیکاری و آریتمی و ضد مسمومیت، ضد مواد سمی ارگاتو فسفره (حشره کش ها)

شکل دارویی: قرص و آمپول

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: کم کاری قلبی (برادیکاری) و بلوک قلبی و مهار رفلکس واگ (تحریک ناحیه گلو که باعث استفراغ می شود)

میزان مصرف: قبل از عمل ۰.۵ تا ۱ میلی گرم از راه وریدی تزریق می شود و هر ۵ دقیقه حداکثر ۲ میلی گرم تزریق شود.

موارد مانع: حساسیت شدید، خونریزی حاد، آب سیاه چشم و در موارد نارسایی کبدی، کلیوی و قلبی با احتیاط مصرف شود.

عوارض جانبی: خشکی دهان، تشنگی، بیوست، احتباس ادرار، سر درد و تپش قلب

توجهات: علائم حیاتی مثل تعداد ضربان قلب و فشار خون را باید کنترل کنید. در سالمندان باید میزان کمتری تجویز شود.

آموزش: در صورت علائم خشکی دهان غر غره آب و مصرف آدامس مفید است.

شرایط نگهداری: دارو در دمای معمولی اتاق نگهداری شود.

ایزوسورباید دی نترات (نام تجاری: Isordil)

گروه دارویی: نیترات ها (قلبی)

گروه درمانی: ضد درد قلبی

شکل دارویی: قرص خوراکی و زیر زبانی

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: در درمان آنژین قلبی ، پیشگیری از درد های قلبی و مهار حملات درد های قلب. درد قلبی ، نارسایی قلبی ، بیماری های عروق محیطی و اسپاسم مری

میزان مصرف: ۲,۵ تا ۱۰ میلی گرم به صورت زیر زبانی استفاده شود و در حملات قلبی میتوان آن را تکرار کرد.

موارد مانع: در کاهش فشار خون ، حساسیت شدید دارویی ، کم خونی شدید ، بالا بودن فشار داخل مغزی و سکتة های قلبی اخیر

عوارض جانبی: سردرد ، کاهش فشار خون ، تپش قلب ، تاکیکاردی (افزایش تعداد ضربان قلب)، بی نظمی قلبی ، احساس گرما و داغ شدن بدن ، خستگی

توجهات: علائم حیاتی بیمار باید کنترل شود. با الکل و آسپیرین تداخل دارویی دارد.

آموزش: دارو قبل یا ۲ ساعت بعد از غذا میل شود. دارو طبق دستور پزشک مصرف شود. عارضه سردرد و در این دارو شایع است. این دارو به محض احساس درد قفسه سینه ، باید زیر زبان گذاشته شود.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.

اپی نفرین

(نام تجاری: Adernalin)

گروه دارویی: سمپاتومیمیتیک

گروه درمانی: بازکننده ریه ، بالا برنده فشار خون

شکل دارویی: تزریقی

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: ایست قلبی - در احیای قلب و ریه داروی بسیار حیاتی است و در مورد شوک ناشی از حساسیت دارویی (آنافیلاکسی) یا آسم و حملات ریوی در کودکان و جوانان بسیار مفید است.

میزان مصرف: میزان غلظت آن ۱/۱۰۰,۰۰۰ یا ۱/۱۰,۰۰۰ قابل استفاده در آسم به صورت زیر جلدی با غلظت ۱/۱۰۰۰ به میزان ۰,۱ تا ۰,۵ میلی گرم تزریق شود.

موارد مانع: آسیب مغزی ، بی نظمی قلب ، نارسایی عروق و حساسیت دارویی

عوارض جانبی: سر درد ، تپش قلب ، تهوع ، افزایش فشار خون ، سنکوپ

توجهات: در تهیه غلظت طبق دستور عمل شود. گاهی برای بی حسی موضعی از ترکیب اپی نفرین و لیدوکائین استفاده می شود. این کار را در انتهای اندام ها (دست و پا) نباید انجام داد. قلب و فشار خون را کنترل کنید.

آموزش: افزایش تعداد ضربان قلب جزء عوارض دارویی است. از مصرف خودسرانه دبه ویژه در سالمندی پرهیز کنید. در صورت احتمال حساسیت دارویی به ویژه آنتی بیوتیک ، آن را آماده داشته باشید.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.

اکسی بوتینین**(نام تجاری: Ditropan)**

گروه دارویی: آمین نسل سوم

گروه درمانی: ضد اسپاسم

شکل دارویی: قرص ۵ میلی گرمی

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: درد و تحریک مثانه و شب ادراری، بی اختیاری ادراری

میزان مصرف: یک قرص ۲ تا ۳ بار در روز

موارد مانع: حساسیت شدید به دارو، میاستنی گراویس، انسداد روده، نارسایی کلیه

عوارض جانبی: تب، سردرد، تاری دید، تهوع، یبوست، سرگیجه، افزایش ضربان قلب، میدریاز (باز شدن مردمک چشم)،

کاهش میل جنسی مردان

توجهات: تشنج و تحریک پذیری از علائم مسمومیت است.

آموزش: در صورت علائم خواب آلودگی و اختلال هوشیاری به پزشک اطلاع دهید. خشکی دهان از عوارض شایع است از آدامس

و یا آب نبات استفاده کنید.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود

اکسازپام**(نام تجاری: Serax)**

گروه دارویی: بنزودیازپین ها

گروه درمانی: ضد اضطراب

شکل دارویی: قرص

مصرف در دوران حاملگی: گروه D

موارد مصرف: آرام بخش، اختلالات اضطرابی، بی خوابی

میزان مصرف: ۱ تا ۲ قرص ۳ تا ۴ بار در روز

موارد مانع: حساسیت شدید دارویی، درپورفیری و در مسمومیت با الکل منع مصرف دارد.

عوارض جانبی: تهوع، خواب آلودگی، کاهش فشار خون، زردی، خارش پوست

توجهات: کنترل تست های خونی و کبدی ضروری است. در دوره حاملگی و شیر دهی توصیه نمی شود.

آموزش: دارو را بهتر است با غذا مصرف کنید. اختلال خواب جزء عوارض نادر است. در هنگام مصرف از رانندگی خودداری کنید.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

آتراکوریوم**(نام تجاری: Tracrium)**

گروه دارویی: مسدود کننده عصبی - عضلانی
 گروه درمانی: شل کننده عضلات مخطط (استخوانی)
 شکل دارویی: تزریقی
 مصرف در دوران حاملگی: مطالعه نشده.

موارد مصرف: در بیهوشی، تسهیل در لوله گذاری، شل کردن عضلات مخططو کمک در بیهوشی عمومی
 میزان مصرف: بر اساس نیاز فرد از ۰.۴ تا ۰.۵ میلی گرم تزریق وریدی مفید است
 موارد مانع: حساسیت شدید دارویی، آسم، بیماری عصبی-عضلانی (میاستنی گراویس)

عوارض جانبی: کاهش فشار خون، عوارض جلدی، مشکل تنفسی، مشکل اختلال در تخلیه ترشحات ریه
 توجهات: میزان اولیه دارو در ۳۰ تا ۶۰ ثانیه انفوزیون شود.
 آموزش: تاریخچه حساسیت یا مشکلات عضلانی - تنفسی را به پزشک بیهوشی اطلاع دهید.
 شرایط نگهداری: در دمای ۲ تا ۸ درجه نگهداری شود.

ایزونیازید**(نام تجاری: Laniazid)**

گروه دارویی: اسید هیدرازید (INH)

گروه درمانی: ضد سل

شکل دارویی: قرص و تزریقی

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: درمان سل ریوی

میزان مصرف: در سل ۵ تا ۱۰ میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن تا حداکثر ۳۰۰ میلی گرم یک بار در روز استفاده شود.

موارد مانع: سابقه حساسیت دارویی، ضایعه عصب بینایی

عوارض جانبی: ضایعات عصبی محیطی، گزگز در دست و پا، تب، ضایعات پوستی، اختلالات خونی، تهوع و استفراغ، خشکی دهان، بزرگی پستان مردان

توجهات: مصرف همزمان هیدروکسی آلومینیوم با ایزونیازید اثر آن را کاهش می دهد. در صورت تهوع و سرگیجه یا تاری دید به فکر مسمومیت با دارو باشید.

آموزش: مصرف دارو در بیماران کبدی ممنوع است. معاینه دوره ایچشم ضروری است. کنترل فشار خون بیمار ضروری است. بهتر است دارو یک ساعت قبل از غذا یا ۲ ساعت بعد از غذا میل شود.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.

آلبومین (انسانی)**(نام تجاری: Albuminar)**

گروه دارویی: مشتقات خونی

گروه درمانی: افزایش دهنده حجم پلاسما

شکل دارویی: تزریقی (انفوزیون)

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: شوک، سوختگی، کاهش پروتئین، افزایش بیلی روبین

میزان مصرف: در شوک با ۵۰۰ میلی لیتر محلول ۵٪ شروع شود.

موارد مانع: حساسیت به آلبومین، آنمی شدید، نارسایی احتقانی قلب، ولی در نارسایی کلیه و ریه با احتیاط مصرف شود.

عوارض جانبی: سر درد فشار خون بالا، ادم ریوی، تاکیکاردی، کهیر، استفراغ

توجهات: در موارد افزایش بیلی روبین در کودکان توجهات خاص لازم است، میزان مصرف در نوزادان و شیرخواران ۱ گرم به ازای هر کیلوگرم است.

آموزش: در صورت علائم افزایش حساسیت به پزشک اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: در یخچال نگهداری شود.

انسولین**(نام تجاری: Iletin)**

گروه دارویی: هورمون ها

گروه درمانی: ضد دیابت (قندی)

شکل دارویی: تزریقی

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: کنترل دیابت قندی، کتواسیدوز دیابتی، دیابت ناشی از حاملگی

میزان مصرف: طبق دستور متخصص عمل شود. البته ۰.۵ تا ۱ واحد به ازای هر کیلو گرم وزن معمول است.

موارد مانع: حساسیت شدید دارویی و پایین بودن قند از موارد ممنوعیت حساب می شود.

عوارض جانبی: کاهش قند خون، تورم، قرمزی، درد محل تزریق، ضایعات جلدی آنروفی (لاغری) در محل تزریق، شوک و حساسیت شدید.

توجهات: تنها انسولین رگولار یک ساعت قبل از غذا است. هر گاه دو انسولین رگولار و NPH را با هم دیگر می خواهید تزریق کنید همیشه ابتدا انسولین رگولار را به داخل سرنگ بکشید.

آموزش: بهترین زمان تزریق انسولین رگولار یک ساعت قبل از غذا است. سطح قند خون را با دستگاههای خانگی اندازه گیری کنید. بیمار می بایست برای کنترل قند خون رژیم را نیز رعایت کند.

شرایط نگهداری: انسولین را در درجه حرارت اتاق می توان تا یک ماه نگهداری کرد. دارو نباید در معرض نور خورشید یا حرارت قرار بگیرد. دمای مناسب ۵ تا ۳۸ درجه است

آ - ث - آ**(نام تجاری: Excedrin)**

گروه دارویی: ترکیب استامینوفن + A.S.A + کافئین

گروه درمانی: ضد درد , ضد تب

شکل دارویی: قرص

مصرف در دوران حاملگی: گروه D

موارد مصرف: درد های خفیف , تا متوسط , تب

میزان مصرف: بالغین یک قرص هر چهار ساعت

موارد مانع: زخم های گوارشی , آسم , بیماری های خونریزی دهنده , فشار خون بالا , و نارسایی کلیه و کبد

عوارض جانبی: ناراحتی گوارشی , تهوع و استفراغ , - مهمترین عارضه آسیب کلیوی است

توجهات: توصیه به مصرف شیر یا آب با دارو - در بیماران آسمی پولیپ بینی - تب یونجه و کهیر مزمن - ایجاد علائم میکند ,

وزوز گوش می آورد.

آموزش: ۱- با داروهای ضد اسید معده مصرف شود ۲- در درمان دردهای قبل از دوره ماهانه خانم ها بهتر است ۱ تا ۲ روز قبل از

شروع دوره ماهانه مصرف شود ۳- با یک لیوان آب مصرف شود.

شرایط نگهداری: در جای خشک نگهداری شود.

نکته: این دارو در آرتريت روماتوئید , بیماری های قلبی

برم هگزین کلراید**(نام تجاری: Bisolvon)**

گروه دارویی: اکسپکتورانت

گروه درمانی: خلط آور

شکل دارویی: شربت , قرص , آمپول

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: سرفه های توام با خلط

میزان مصرف: در بالغین ۱۰ تا ۲۰ میلی گرم خوراکی

موارد مانع: حساسیت دارویی ولی در آسم با احتیاط تجویز شود.

عوارض جانبی: ناراحتی دستگاه گوارش , سردرد و ضایعات پوستی

توجهات: در صورت مصرف طولانی تست کلیوی و کبدی باید کنترل شود.

آموزش: به همراه مصرف دارو ممکن است تعریق بروز کند. در صورت مشکلات گوارشی مثل زخم معده به پزشک اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.

آپرازولام**(نام تجاری: Xanax)**

گروه دارویی: بنزودیازپین ها

گروه درمانی: ضد اضطراب ، خواب آور

شکل دارویی: قرص ۰,۵ و ۱ میلی گرمی

مصرف در دوران حاملگی: گروه D

موارد مصرف: اضطراب و حمله ترس

میزان مصرف: ۰,۲۵ تا ۰,۵ میلی گرم سه بار در روز

موارد مانع: حساسیت به این گروه از دارو ها ، گلوکوم حاد زاویه بسته ، دوران حاملگی

عوارض جانبی: سرگیجه ، خواب آلودگی ، تاکیکاردی ، مشکلات تنفسی

توجهات: به بیمار توصیه می شود به هنگام مصرف دارو از رانندگی پرهیز کند.

آموزش: خواب آلودگی به ویژه در سالمندان و بزرگسالان باید تذکر داده شود.

شرایط نگهداری: در دمای ۱۵ تا ۳۰ درجه نگهداری شود.

اسید فولیک**(نام تجاری: Folvite)**

گروه دارویی: ویتامین ها

گروه درمانی: اسید فولیک (VB6)

شکل دارویی: قرص ۱ میلی گرمی و تزریقی

مصرف در دوران حاملگی: گروه A

موارد مصرف: کمبود اسید فولیک ، درمان کم خونی

میزان مصرف: در درمان یک قرص روزانه و در پیشگیری ۰,۲ میلی گرم در روز مفید است.

موارد مانع: حساسیت شدید دارویی

عوارض جانبی: ضایعات تنفسی و پوستی بروز می کند ولی نادر است.

توجهات: این دارو در «می مگالوبلاستیک باید همیشه همراه با ویتامین ب ۱۲ باشد. این دارو در زنان حامله و سالمند بسیار مفید است.

آموزش: دارو را خودسرانه استفاده نکنید. در صورت احتمال حساسیت به پزشک اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.

استامینوفن**(نام تجاری: Paracetamol)**

گروه دارویی: مشتق پارا آمینوفنل

گروه درمانی: ضد درد غیر مخدر , ضد تب

شکل دارویی: قرص , شربت , شیاف , قطره , ویال

مصرف در دوران حاملگی: گروه **B**

موارد مصرف: درد های خفیف , تب

میزان مصرف: بالغین ۳۲۵ تا ۵۰۰ میلی گرم - کودکان ۱۲۰ تا ۲۴۰ میلی گرم

موارد مانع: بیماری های شدید کبدی , حساسیت دارویی

عوارض جانبی: ضعف , خواب آلودگی , زخم دهانی , راش , ادرار خونی یا کدر , درد شکمی , مشکلات خونی , یرقان

توجهات: قرص استامینوفن را میتوان خرد کرد و با مایعات دیگر مخلوط کرد و خورد , با شیرینی ها مصرف نشود.

آموزش: دارو با یک لیوان آب مصرف شود.

استازولامید**(نام تجاری: AK-ZOL)**

گروه دارویی: مهار کننده آنزیم کرینیک آنهیدراز

گروه درمانی: ضد گلوکوم , ضد تشنج , ضد ادم

شکل دارویی: قرص و آمپول , قرص ۲۵۰ میلی گرمی , تزریقی ۵۰۰ میلی گرمی

مصرف در دوران حاملگی: گروه **C**

موارد مصرف: گلوکوم (آب سیاه) چشم (با زاویه باز) درمان نارسایی قلبی و ادم آن , بیماری حاد ارتفاع تشنج میکلونیک ,

جلوگیری از سنگ سازی کلیوی

میزان مصرف: در گلوکوم چشمی ۲۵۰ میلی گرم خوراکی ۱ تا ۴ بار در روز در ادم قلبی ۲۵۰ تا ۳۷۵ میلی گرم ۱ تا ۲ روز در

میان , در تشنج ۸ تا ۳۰ میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن حداکثر یک گرم روزانه مصرف شود.

موارد مانع: حساسیت دارویی , گلوکوم با زاویه بسته , کاهش سدیم و پتاسیم بدن , بیماری کبدی , نارسایی غده فوق کلیه.

عوارض جانبی: درد محل تزریق , مهمترین عارضه آن کم خونی و کاهش گلوبول سفید (WBC) , خواب آلودگی

توجهات: فشار داخل چشم بیمار را کنترل کنید.

آموزش: دارو را صبح ها مصرف کنید , وزن خود را مرتب اندازه گیری کنید.

شرایط نگهداری: هر چند در مخلوط شدن با آب تا یک هفته حفظ میشود ولی بهتر است فقط ۲۴ ساعت اول از آن استفاده شود

. در دمای اتاق نگهداری شود.

نکته: تزریق وریدی (IV) بر تزریق عضلانی (IM) ارجح است.

بیزاکودیل**(نام تجاری: Biscalax)**

گروه دارویی: مشتقات دی فنیل متان

گروه درمانی: ملین و محرک دستگاه گوارش (اسهال آور)

شکل دارویی: قرص و شیاف ۵ و ۱۰ میلی گرمی

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: یبوست حاد و گذرا یا آماده سازی بیمار برای اقدامات تشخیصی رادیوگرافی و کولونوسکوپی (اندسکوپی تشخیصی)

میزان مصرف: ۱ یا ۲ عدد قرص یا شیاف در بالغین و کودکان بالای ۱۲ سال

موارد مانع: در تهوع و استفراغ، مشکلات شکم حاد، انسداد روده

عوارض جانبی: تهوع، درد شکمی، اسهال و درد اطراف مقعد

توجهات: با توجه به زمان اثر دارو بهتر است شیاف ۱ تا ۲ ساعت قبل از اقدامات تشخیصی مثل رادیوگرافی استعمال شود و نوع خوراکی «شب قبل استفاده شود».

آموزش: بهتر است مایعات و غذاهای پر فیبر استفاده شود. عادت به دارو مطلوب نیست.

شرایط نگهداری: در دمای ۱۵ تا ۲۵ درجه نگهداری شود. پوشش شیاف را تا زمان استعمال باز نکنید.

بوپی واکائین**(نام تجاری: Marcaine)**

گروه دارویی: مشتقات آمیدی

گروه درمانی: بی حس کننده نخاعی و اعصاب محیطی

شکل دارویی: تزریقی

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: بی حسی موضعی - نخاعی - بلوک عصبی - جراحی چشم، بی حسی برای زایمان طبیعی و سزارین

میزان مصرف: میزان تزریق با توجه به سن و نوع بی حسی متفاوت است.

موارد مانع: حساسیت شدید دارویی، در بلوک عصبی (Bier's) ساعد و بلوک گردنی و حاملگی ممنوع است.

عوارض جانبی: ایست قلبی، تشنج، سرگیجه، تهوع و ضایعات موضعی

توجهات: میزان دارو باید دقیق باشد. تداخلات دارویی با بوپی واکائین باید مد نظر پزشک باشد. بیمار می بایست مونیتورینگ قلب شود.

آموزش: در صورت استفاده در چشم پزشکی یا دندانپزشکی از خوردن به مدت چند ساعت خودداری شود. بیمار باید اطلاعات مربوط به مصرف داروهای دیگر را به پزشک اطلاع دهد.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی و از یخ زدن دارو خودداری کنید.

ایبوپروفن**(نام تجاری: Advil)**

گروه دارویی: اسید پروپیونیک

گروه درمانی: ضد التهاب، ضد درد

شکل دارویی: قرص و محلول

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: درد های عمومی، قلب، بیماری های روماتیسمی، درد قاعدگی

میزان مصرف: یک تا ۲ قرص هر ۴ تا ۶ ساعت

موارد مانع: در فشار خون بالا، ناراحتی کلیوی، حساسیت شدید دارویی و زخم فعال معده

عوارض جانبی: تهوع، استفراغ، دل درد، خونریزی دستگاه گوارش

توجهات: در صورت درمان دراز مدت آزمایشهای کبدی کلیوی لازم است. گزارش مدفوع قیری رنگ به نفع خونریزی گوارشی است.

آموزش: در صورت سرگیجه، اختلال هوشیاری و خواب آلودگی شدید به پزشک اطلاع دهید. بهتر است دارو یک ساعت قبل یا بعد از غذا مصرف شود.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود

باکلوفن**(نام تجاری: Lioresal)**

گروه دارویی: مشتق کلروفنیل

گروه درمانی: شل کننده عضلات اسکلتی (مخطط)

شکل دارویی: قرص ۱۰ و ۲۵ میلی گرمی

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: اسپاسم عضلات در بیماری های MS (مولتیپل اسکلروزیس) و ضایعات نخاعی

میزان مصرف: ۴۰ تا ۸۰ میلی گرم در روز

موارد مانع: حساسیت دارویی

عوارض جانبی: خواب آلودگی، تشنج، تهوع و استفراغ

توجهات: کنترل دوره ای قند خون و عملکرد کبد ضروری است چون احتمال تشنج با این دارو بالا است. در بیماران تشنجی مراقب باشید.

آموزش: قطع ناگهانی دارو ممکن است باعث تشنج شود. دارو را با غذا میل کنید. از رانندگی اجتناب شود.

شرایط نگهداری: در درجه حرارت اتاق نگهداری شود.

تئوفیلین**(نام تجاری: Bronkodyl-phyllin)**

گروه دارویی: متیل گزاتین

گروه درمانی: ضد آسم ، باز کننده ریه

شکل دارویی: قرص و کپسول

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: حمله حاد آسم ، آسم مزمن ، برونشیت

میزان مصرف: در حملات حاد ۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم هر ۶ تا ۸ ساعت

موارد مانع: حساسیت شدید دارویی، سالمندان ، نارسایی کبدی و کلیوی، فشار خون بالا، سکنه قلبی، دیابت

عوارض جانبی: سردرد ، تهوع ، استفراغ ، تشنج ، تحریک پذیری ، اسهال ، ضایعات جلدی و طاسی

توجهات: سر در ، اسهال و بی خوابی علائم مسمومیت است. تئوفیلین خوراکی در درمان حملات حاد آسم کارایی جدی ندارد.

آموزش: برای پیشگیری از عوارض گوارشی آن را با غذا میل کنید.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.

ب - کمپلکس**(نام تجاری: Becotal)**

گروه دارویی: ویتامین ها

گروه درمانی: ب - کمپلکس

شکل دارویی: قرص ، شربت ، آمپول

مصرف در دوران حاملگی: گروه A

موارد مصرف: درمان یا پیشگیری از کمبود ویتامین های گروه B

میزان مصرف: برای پیش گیری از کمبود ویتامین های گروه B 1 تا ۳ قرص روزانه یا ۱ تا ۳ قاشق مربا خوری شربت روزانه یا

یک آمپول روزانه

موارد مانع: حساسیت شدید به دارو

عوارض جانبی: ضایعات جلدی یا خارش

توجهات: دارو در زمان تزریق باید فاقد رسوب باشد.

آموزش: به همراه دارو ، مواد غذایی حاوی ویتامین های گروه B را مصرف کنید.

شرایط نگهداری: دارو در دمای معمولی اتاق نگهداری شود.

نکته: دارو بهتر است به صورت عضلانی تزریق شود.

بنامتازون**(نام تجاری: Celestone)**

گروه دارویی: گلوکوکورتیکوئید (کورتون)

گروه درمانی: ضد التهاب، مهار ایمنی

شکل دارویی: قرص و آمپول

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: التهاب شدید و مهار سیستم ایمنی، نارسایی کورتکس آدرنال
 میزان مصرف: روزانه ۰,۶ تا ۷,۲ میلی گرم به صورت خوراکی یا ۰,۵ تا ۹ میلی گرم وریدی
 موارد منع: عفونت های قارچی و حساسیت شدید

عوارض جانبی: سردرد، افزایش اشتها، ضعف، افزایش وزن، پرمویی صورت، بی خوابی و بی قراری
 توجهات: قطع داروی استروئیدی باید به تدریج و طی یک هفته صورت گیرد.
 آموزش: بنامتازون خوراکی را باید همراه غذا یا شیر استفاده کرد.
 شرایط نگهداری: در جای خشک و خنک نگهداری شود.

بای پیریدن**(نام تجاری: Akineton)**

گروه دارویی: آنتی کولینرژیک

گروه درمانی: ضد پارکینسون

شکل دارویی: قرص ۲ میلی گرمی، آمپول ۵ میلی گرمی

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: پارکینسون و علائم اکستراپیرامیدال در مسمومیت دارویی مثلاً در مسمومیت با داروی ضد استفراغ تزریقی یا خوراکی متوکلوپرامید

میزان مصرف: ۲ میلی گرم ۳ یا ۴ بار در روز یا ۲ میلی گرم از طریق عضلانی

موارد منع: حساسیت شدید دارویی، آب سیاه چشم، انسداد روده، بیماری میاستنی گراویس

عوارض جانبی: یبوست، استعداد گرمزدگی، خشکی دهان، استفراغ، و احتباس ادرار
 توجهات: قرص خوراکی آن با غذا میل شود، تزریق وریدی آن آهسته صورت گیرد، در صورت خشکی دهان، استفاده از مایعات و آدامس مفید است.

آموزش: در صورتی که مصرف دارو باعث احتباس ادراری شود به پزشک اطلاع دهید. در هوای گرم باعث افزایش گرمزدگی می شود.

شرایط نگهداری: در جای خشک و خنک نگهداری شود.

پروپرانولول**(نام تجاری: Inderal)**

گروه دارویی: مهار کننده گیرنده بتا ۲

گروه درمانی: ضد فشار خون , ضد میگرن

شکل دارویی: قرص , آمپول

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: فشار خون , بی نظمی ریتم قلبی, درمان درد قلبی , پیشگیری سردرد عروقی

میزان مصرف: در فشار خون ۴۰ میلی گرم ۲ بار در روز و در آریتمی ۲, ۴۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم

موارد مانع: در مورد شوک قلبی , نارسایی احتقانی قلبی, آسم ریوی ممنوع است.

عوارض جانبی: خستگی , کاهش فشار خون , درد قفسه سینه , وزوز گوش , اشکال در صحبت کردن, تهوع , اسهال , شب

ادراری , کاهش میل جنسی , عفونت مجاری ادراری , درد کلیوی , درد مفاصل و کمر درد و ضایعات پوستی

توجهات: فشار خون و نوار قلب بیمار باید کنترل شود. دارو به همراه غذا تجویز شود.

آموزش: مصرف دارو نباید به طور ناگهانی قطع شود. این دارو در سالمندان با احتیاط مصرف شود. در موارد اضطراب و تپش قلب

هم کاربرد دارد.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.

پرازوسین**(نام تجاری: Minipress)**

گروه دارویی: بلوک کننده گیرنده آلفا

گروه درمانی: گشاد کننده عروق, ضد فشار خون

شکل دارویی: قرص

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: فشار خون خفیف تا متوسط

میزان مصرف: ۱ تا ۲ میلی گرم ۲ تا ۳ بار در روز

موارد مانع: حساسیت شدید دارویی

عوارض جانبی: خشکی دهان , اسهال , درد شکم , خونریزی از بینی , درد عضله و استخوان, تاری دید, ضعف و خواب آلودگی

توجهات: علائم حیاتی بیمار کنترل شود. احتمال سنکوپ در میزان بالای دارو شایع است.

آموزش: بدون اجازه پزشک دارو به طور ناگهانی قطع نشود. بار اول دارو در سب میل شود. خشکی دهان جزء عوارض شایع است

آدامس یا آب نبات استفاده کنید.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

پتیدین**(نام تجاری: Dolantin)**

گروه دارویی: فینیل پیریدین

گروه درمانی: مخدر

شکل دارویی: تزریقی

مصرف در دوران حاملگی: گروه B و گروه D در حوالی زمان زایمان

موارد مصرف: درد متوسط و شدید و قبل از عمل و کمک بیهوشی

میزان مصرف: ۲۵ تا ۱۰۰ میلی گرم عضلانی یا زیر جلدی یا آهسته وریدی هر ۴ ساعت

موارد مانع: در آسم، حساسیت شدید دارویی، تشنج، افراد پیر و نارسایی کبد و کلیه

عوارض جانبی: خواب آلودگی، یبوست، تشنج، خشکی دهان و ..

توجهات: تزریق زیر جلدی به علت درد توصیه نمی شود. علائم حیاتی بیمار را کنترل کنید. برای تزریق وریدی سرم در نرمال سالین یا سرم دکستروز رقیق کنید.

آموزش: به علت خواب آلودگی کار دقیق و رانندگی ممنوع است. در تزریق سریایی، بیمار باید همراه با ویلچر جا به جا شود. شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

پیروکسیکام**(نام تجاری: Feldene)**

گروه دارویی: اکسی کام

گروه درمانی: ضد درد (غیر استروئیدی)

شکل دارویی: کپسول، پماد (ژل)، تزریقی

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: درد های اسکلتی-عضلانی، رماتیسم مفصلی، رماتیسم جوانان

میزان مصرف: ۲ کپسول روزانه و قابل افزایش است.

موارد مانع: حساسیت شدید دارویی، زخم فعال معده و روده، مشکلات خونریزی دهنده

عوارض جانبی: فلج عصب سیاتیک، عوارض گوارشی، زخم معده، تنوع نوع تزریقی آن باعث عوارض موضعی و فلج عصب سیاتیک شده که مصرف آن توسط وزارت بهداشت ممنوع شده است.

توجهات: تست های کبدی و کلیوی ضروری است. دارو را با غذا استفاده کنید.

آموزش: خواب آلودگی شدید، خستگی و سرگیجه را به پزشک اطلاع دهید. دارو را با یک لیوان آب مصرف کنید.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

پرومتازین**(نام تجاری: Phenergan)**

گروه دارویی: فنوتیازین ها

گروه درمانی: آرام بخشی , ضد حساسیت

شکل دارویی: قرص و شربت و آمپول

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: حساسیت و خارش پوستی , بی خوابی , تهوع , استفراغ

میزان مصرف: در بالغین یک قرص و کودکان یک قاشق شربت ۰,۱ میلی گرم هر ۶ ساعت

موارد مانع: حساسیت شدید دارویی , صرع , حملات حاد فشار خون

عوارض جانبی: عوارض خونی , زردی , تشنج , کوما , سرگیجه , بی قراری و بی اشتهاپی , یبوست , خشکی دهان , مشکلات تنفسی , استفراغ

توجهات: داروی خوراکی با غذا یا شیر یا آب میوه استفاده شود. وضعیت تنفسی بیمار باید کنترل شود. مرگ ناگهانی در نوزادان و شیر خواران گزارش شده است.

آموزش: به علت خواب آلودگی از رانندگی اجتناب شود. بدون تجویز پزشک مصرف نشود.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

پروپوفول**(نام تجاری: Diprivan)**

گروه دارویی: سدایتو ها

گروه درمانی: دارو های کمک بیهوشی

شکل دارویی: تزریقی

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: برای القا بیهوشی عمومی (سریع اثر و کوتاه اثر) , استفراغ

میزان مصرف: بسته به وضعیت بیمار تعیین می شود.

موارد مانع: حساسیت شدید دارویی , صرع , سالمندان و در فردی که فشار داخل مغزی بالایی دارد, منع مصرف دارد.

عوارض جانبی: ایست قلبی, ریوی, کاهش فشار خون, درد و سوزش محل تزریق , کهیر , خشکی دهان , احتباس ادراری , تغییر رنگ پوست , سرفه , سوزش گلو , اختلال شنوایی و بینایی , احساس سرما و لرز , تشنج و خواب آلودگی

توجهات: در سالمندان با احتیاط تجویز شود. خطر مصرف دراز مدت آن چربی خون می باشد. پروپوفول را همزمان با خون و پلاسما از راه یک ورید تجویز نکنید.

آموزش: مثل دیگر گاز های بیهوشی توجهات ویژه لازم دارد.

شرایط نگهداری: در دمای ۵ تا ۲۲ درجه نگهداری شود. الزاما در یخچال نگهداری نشود

تتراسایکلین**(نام تجاری: Tetracycline)**

گروه دارویی: تتراسایکلین

گروه درمانی: آنتی بیوتیک

شکل دارویی: کپسول ۲۵۰ میلی گرمی

مصرف در دوران حاملگی: گروه D

موارد مصرف: عفونت های عمومی خفیف تا متوسط، بیماری عفونی لگن ، عفونت گونوکوکی ، بیماری های مقاربتی، سفلیس ،

عفونت مجاری ادراری در زنان

میزان مصرف: یک تا ۲ قرص ۴ بار در روز

موارد مانع: حساسیت شدید دارویی

عوارض جانبی: تهوع ، استفراغ و اسهال جزء عوارض گوارشی آن می باشد. ناراحتی شدید گوارشی و زخم مریمکن است بروز کند. اختلالات خونی نیز از عوارض مهم است.

توجهات: ابتدا از کشت و آنتی بیوگرام می بایست مطمئن شوید. عوارض گوارشی را با خوردن غذا با دارو کاهش دهید.

آموزش: بیمار نباید در معرض نور قرار بگیرد. این دارو نباید تاریخ گذشته باشد زیرا باعث عوارض شدید کلیوی می شود. اسهال را جدی بگیرید و به پزشک اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.

تتراسایکلین**(نام تجاری: Tetracycline)**

گروه دارویی: تتراسایکلین

گروه درمانی: آنتی بیوتیک

شکل دارویی: کپسول ۲۵۰ میلی گرمی

مصرف در دوران حاملگی: گروه D

موارد مصرف: عفونت های عمومی خفیف تا متوسط، بیماری عفونی لگن ، عفونت گونوکوکی ، بیماری های مقاربتی، سفلیس ،

عفونت مجاری ادراری در زنان

میزان مصرف: یک تا ۲ قرص ۴ بار در روز

موارد مانع: حساسیت شدید دارویی

عوارض جانبی: تهوع ، استفراغ و اسهال جزء عوارض گوارشی آن می باشد. ناراحتی شدید گوارشی و زخم مریمکن است بروز کند. اختلالات خونی نیز از عوارض مهم است.

توجهات: ابتدا از کشت و آنتی بیوگرام می بایست مطمئن شوید. عوارض گوارشی را با خوردن غذا با دارو کاهش دهید.

آموزش: بیمار نباید در معرض نور قرار بگیرد. این دارو نباید تاریخ گذشته باشد زیرا باعث عوارض شدید کلیوی می شود. اسهال را جدی بگیرید و به پزشک اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.

توریا مترن - اچ**(نام تجاری: Dyazide)**

گروه دارویی: دیورتیک

گروه درمانی: دیورتیک-ادرار آور(مدر)

شکل دارویی: قرص

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: تورم عمومی بدن (ادم) ناشی از نارسایی قلبی، نارسایی کبدی، فشار خون، درمان کاهش پتاسیم خون

میزان مصرف: ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلی گرم روزانه

موارد مانع: حساسیت شدید دارویی، نارسایی کبدی-کلیوی، هیپرکالمی

عوارض جانبی: سردرد، تهوع، خشکی دهان، سنگ کلیوی، کم خونی، حساسیت به نور، ضایعات جلدی، بیبوست

توجهات: وزن بیمار را مرتب کنترل کنید. سطح پتاسیم خون را اندازه بگیرید.

آموزش: دارو را بعد از غذا میل کنید.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.

جنتامایسین**(نام تجاری: Garamycin)**

گروه دارویی: آمینو گلیکوزیدها

گروه درمانی: آنتی بیوتیک

شکل دارویی: تزریقی ۲۰، ۴۰، ۸۰ میلی گرم

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: عفونت های گرم منفی و برخی از گونه های استاف زخم جراحی، عفونت ادراری، عفونت ناحیه لگن

میزان مصرف: ۳ تا ۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن

موارد مانع: حساسیت شدید دارویی

عوارض جانبی: عوارض کلیوی که بسیار خطرناک است، مشکلات شنوایی، ضعف عمومی، تشنج، عوارض پوستی، خارش،

زخم دهان، راش، کهیر

توجهات: در اختلال عملکرد کلیه میزان آن کاهش یابد یا تنظیم شود. اسهال و خارش جلدی را جدی بگیرید.

آموزش: دارو ها را طبق دستور پزشک مصرف کنید و عوارض جدی را اطلاع دهید. در نوع موضعی جنتامایسین، بیمار نباید در

معرض نور باشد.

شرایط نگهداری: در جای خشک و خنک نگهداری شود.

نکته: نوع موضعی و چشمی را در عفونت های پوست، زخم و سوختگی می توان به کار برد.

دایمتیکون**(نام تجاری: Degas)**

گروه دارویی: دی متیل سیلوکسان ها

گروه درمانی: ضد نفخ

شکل دارویی: قرص و قطره

مصرف در دوران حاملگی: گروه بدون مطالع ، و برای شیر دهی بی خطر است.

موارد مصرف: نفخ شکم ، درمان کمکی در زخم معده ، روده تحریک پذیر ، عدم تحمل به لاکتوز

میزان مصرف: ۳ تا ۴ قرص ۳ بار در روز پس از غذا جویده شود.

موارد مانع: مورد خاصی وجود ندارد.

عوارض جانبی: عارضه خاصی وجود ندارد.

توجهات: این دارو قبل از آندسکوپی یا رادیوگرافی روده مفید است.

آموزش: وعده شب دارو بهتر است هنگام خواب استفاده شود.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

دیازپام**(نام تجاری: Valium)**

گروه دارویی: بنزودیازپین ها

گروه درمانی: آرام بخش ، ضد اضطراب

شکل دارویی: قرص و آمپول

مصرف در دوران حاملگی: گروه D

موارد مصرف: درمان اضطراب ، تشنج ، ضد لرزش ، ضد حملات ترس (پانیک) در اسپاسم عضلانی (به عنوان شل کننده عضلات

، اسپاسم در بیماران کزاز)

میزان مصرف: به نوع بیماری بستگی دارد (۲ تا ۲۰ میلی گرم) دیازپام (IM,IV)

موارد مانع: حساسیت شدید ، کسانی که در مسمومیت شدید با الکل در کما هستند. آب سیاه چشم (گلوکوم زاویه بسته)

عوارض جانبی: خواب آلودگی شدید ، گیجی خشکی دهان ، بیبوست ، زردی ، درد عضلانی ، تنگی نفس ، کم خونی ، اختلالات

سلول های خونی و کاهش فشار خون

توجهات: خواب آلودگی شدید از جمله علائم مسمومیت است. قطع دارو به طور ناگهانی خطر ناک است.

آموزش: در تجویز وریدی احتمال کاهش فشار خون و وقفه تنفسی می رود. می بایست بیمار از مصرف داروهای آرام بخش دیگر

به طور همزمان پرهیز نماید. پس از مصرف دارو از انجام کار های نیاز مند دقت و رانندگی خودداری شود.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی اتاق نگهداری شود.

دگزامتازون**(نام تجاری: Decadrol)**

گروه دارویی: آدرنو کورتیکوئید

گروه درمانی: ضد التهاب، مهار ایمنی

شکل دارویی: تزریقی، قرص، شربت

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: التهاب دهان، داروی مخصوص تست تشخیص بیماری های غده فوق کلیه، ورم مغزی، استفراغ، التهاب مفاصل،

درمان کمکی در مننژیت باکتریال، ورم مجاری هوایی

میزان مصرف: در التهاب مغزی یک تا ۲ آمپول هر ۶ تا ۱۲ ساعت - در مننژیت ۶،۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم هر ۶ ساعت

در روز اول تا چهارم درمان، یا ۱۰ میلی گرم تزریق وریدی و سپس هر ۴ میلی گرم هر ۶ ساعت

موارد مانع: مشابه دیگر کورتون ها

عوارض جانبی: زخم دستگاه گوارش، بیخوابی، احساس انرژی و سرخوشی، تشنج

توجهات: قطع داروی استروئیدی باید به تدریج و طی یک هفته صورت گیرد.

آموزش: بنامتازون خوراکی را باید همراه غذا یا شیر استفاده کرد.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.

دیکلوفناک سدیم**(نام تجاری: Voltaren)**

گروه دارویی: اسید فنیل استیک

گروه درمانی: ضد درد، ضد التهاب

شکل دارویی: قرص، شیاف، آمپول

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: آرتروز (استئوآرتریت)، رماتیسم مفصلی، التهاب بورس و تاندون ها، درد کلیوی

میزان مصرف: یک تا ۲ قرص یا یک شیاف یک تا ۴ بار در روز

موارد مانع: حساسیت به دارو، زخم معده فعال، بیماری پورفیری

عوارض جانبی: تشنج، فشار خون بالا و افزایش قند خون، خونریزی از دستگاه گوارش، کهیر و عوارض پوستی، تنگی نفس

توجهات: برای کاهش تحریک معده قرص را با یک لیوان آب مصرف کنید. برای جذب بهتر دارو آن را تا ۱ ساعت قبل یا بعد از غذا

مصرف کنید.

آموزش: از رانندگی به علت خواب آلودگی ناشی از مصرف دارو پرهیز شود. مصرف به شکل تزریقی با فلج عصب سیاتیک همراه

است و ممنوع شده است.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی اتاق نگهداری شود.

نکته: از مصرف همزمان داروهای ضد درد دیگر مثل آسپیرین خودداری کنید.

دوپامین**(نام تجاری: Dopastat)**

گروه دارویی: سمپاتومیمیتیک

گروه درمانی: تنگ کننده عروق

شکل دارویی: تزریقی

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: محرک قلبی است و در درمان کاهش یا افت فشار خون و شوک قلبی و نارسایی قلبی و نارسایی کلیه مفید است. میزان مصرف: ۴۰۰ تا ۸۰۰ میلی گرم دوپامین در ۲۵۰ سی سی محلول و با غلظت ۱۶۰۰ تا ۳۲۰۰ میکروگرم در هر میلی لیتر انفوزیون شروع شود.

موارد مانع: در بیماری های فنوکروموسیتوما یا آریتمی فیبریلاسیون بطنی یا تاکی آریتمی ممنوعیت مصرف دارد.

عوارض جانبی: تهوع، استفراغ، درد قفسه سینه، تشدید حمله آسمی

توجهات: از مخلوط کردن دوپامین با محلول سرم بی کربنات سدیم یا فنی تونین سدیم خودداری شود. کنترل علائم حیاتی و مونیتورینگ نوار قلبی ضروری است. برای تزریق از ورید های بزرگ استفاده کنید.

آموزش: در محل تزریق ممکن است درد ایجاد شود و در صورت بروز این عارضه به پرستار اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.

رانیتیدین**(نام تجاری: Zantac)**

گروه دارویی: مهار کننده گیرنده اچ - ۲

گروه درمانی: ضد زخم معده

شکل دارویی: قرص و آمپول

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: زخم های معده و دوازدهه، برگشت مواد اسید معده به مری، زخم مری

میزان مصرف: میزان مصرف آن ۲ قرص روزانه می باشد.

موارد مانع: حساسیت شدید دارویی

عوارض جانبی: سردرد، سرگیجه، اسهال، درد عضلانی، مشکلات خونی

توجهات: بهتر است ۲ ساعت قبل از غذا مصرف شود. میزان تجویز در نارسایی کلیه کاهش یابد. تجویز B12 در درمان دراز مدت ضروری است. تست های کبدی ضروری است.

آموزش: دارو منظم استفاده شود.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.

سیپروفلوکساسین**(نام تجاری: Ciproxin)**

گروه دارویی: فلوروکینولون
گروه درمانی: آنتی بیوتیک
شکل دارویی: قرص و تزریقی
مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: عفونت های ادراری ، عفونت ریوی ، پوستی و التهابی مجاری ادراری و استخوانی
میزان مصرف: در زمان عفونت سطحی (خفیف تا متوسط) ۵۰۰ میلی گرم روزانه در دو مرحله قسمت شده و در موارد شدید ۱۰۰۰ میلی گرم خوراکی در دو مرحله روزانه تقسیم شده طی ۷ تا ۱۴ روز ، شکل تزریقی برای نوع خفیف ۴۰۰ میلی گرم برای نوع شدید ۸۰۰ میلی گرم وریدی
موارد مانع: حساسیت به کینولونها و نالیدیکسیک اسید

عوارض جانبی: عوارض گوارشی مثل سوء هاضمه ، تهوع ، تشنج ، خواب آلودگی ، ضایعات پوستی مثل راش ، آسیب کلیوی ، کندی بالا رفتن فشار خون ، کم خونی
توجهات: در صورت بروز اسهال باید بیمار را از نظر آب و الکترولیت اداره کرد. مصرف مایعات کافی به همراه دارو توصیه می شود. در نارسایی کلیه میزان دارو باید کاهش یابد.
آموزش: بین مصرف سیپرو و آنتی اسید باید ۴ ساعت فاصله باشد. افرادی که سابقه تشنج (صرع) دارند قبل از مصرف دارو با پزشک مشورت کنند.
شرایط نگهداری: در دمای ۱۵ تا ۳۰ درجه نگهداری شود.

سفتازیدیم**(نام تجاری: Fortum)**

گروه دارویی: سفاسپورین نسل سوم
گروه درمانی: آنتی بیوتیک
شکل دارویی: ویال
مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: عفونت ریوی ، عفونت ادراری - پوستی ، عفونت استخوان ، آبسه های داخل شکم ، عفونت پرده مغز (مننژیت)
میزان مصرف: ۰.۵ تا ۱ گرم سفتازیدیم از راه عضلانی
موارد مانع: حساسیت شدید ، افراد مستعد خونریزی ، ولی در افراد با سابقه کم خونی و تشنج یا مشکلات کلیوی با احتیاط مصرف شود.

عوارض جانبی: خارش ، کهیر ، ادم ، عارضه کلیوی، درد محل تزریق
توجهات: در صورت اسهال شدید دارو را قطع کنید.
آموزش: هر گونه عفونت در محل جدید را به پزشک اطلاع دهید.
شرایط نگهداری: در دمای ۱۵ تا ۳۰ درجه نگهداری شود.

سالبوتامول**(نام تجاری: Ventolin)**

گروه دارویی: تحریک سمپاتیک

گروه درمانی: باز کننده مجاری هوایی ریه

شکل دارویی: قرص ، شربت ، تزریقی ، اسپری

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: آسم (به ویژه حملات حاد آسم) ، بیماری های انسدادی ریه ، برونشیت ، پیشگیری از زایمان زودرس
 میزان مصرف: اسپری آن هر ۶ ساعت یک پاف ، در آسم مزمن ۴ میلی گرم شربت هر ۶ تا ۸ ساعت و ۸ میلی گرم تزریقی
 موارد مانع: در افراد زیر ۱۲ سال و در بی نظمی های ریتم قلبی ممنوع است.
 عوارض جانبی: تهوع ، لرزش دست ، بی قراری ، خشکی دهان ، بی خوابی ، تپش قلب ، افزایش ضربان قلب ، استفراغ
 توجهات: لبه بیمار گوشزد کنید که رزش دست شایع است. بی خوابی گاهی مشکل آفرین است.
 آموزش: در صورت عدم اصلاح مشکل تنفسی بیمار به پزشک اطلاع دهید. احتمال سرگیجه و منگی را به بیمار تذکر دهید.
 شرایط نگهداری: قرص و شربت در دمای معمولی و نوع اسپری آن را دور از نور نگهداری کنید.

سفتریاکسون**(نام تجاری: Recephin)**

گروه دارویی: سفاوسپورین نسل سوم

گروه درمانی: آنتی بیوتیک

شکل دارویی: ویال ۲۵۰ میلی گرمی ، ۵۰۰ میلی گرمی ، و ۱ گرمی

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: عفونت های تنفسی ، عفونت پوست و استخوان و کلیه
 میزان مصرف: ۱ تا ۲ گرم هر ۱۲ ساعت تا ۴ گرم حداکثر مصرف روزانه است . در مورد عفونت گونوره تزریق یک بار ۱۲۵ تا ۲۵۰ میلی گرم به همراه مصرف ۷ روز واکسی سیکلین
 موارد مانع: حساسیت شدید ، افراد مستعد خونریزی ، ولی در افراد با سابقه کم خونی و تشنج یا مشکلات کلیوی با احتیاط مصرف شود.

عوارض جانبی: آلرژی ، عوارض خونی ، اسهال ، ضایعات کیسه صفرا ، اکیموز ، درد محل تزریق

توجهات: این دارو تمایل به خونریزی را افزایش می دهد.

آموزش: هر گونه اسهال یا شل شدن مدفوع را به پزشک اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.

سفتی زوکسیم**(نام تجاری: Cafizox)**

گروه دارویی: سفالوسپورین نسل سوم

گروه درمانی: آنتی بیوتیک

شکل دارویی: ویال ۰,۵ و ۱ میلی گرمی

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: عفونت های ریوی , ادراری , سوزاک , عفونت داخل شکمی , عفونت پوستی , استخوان و مفاصل

میزان مصرف: ۱ تا ۲ گرم هر ۸ تا ۱۲ ساعت

موارد مانع: حساسیت شدید به گروه پنی سیلین ها

عوارض جانبی: مسمومیت , سوزش و درد محل تزریق , پارستیزی , راش پوستی , تهوع , استفراغ , اسهال , سردرد, عواض کلیوی

توجهات: تست های کبدی قبل و حین درمان باید انجام شود.

آموزش: سابقه آلرژی به پنی سیلین و سفالوسپورین را به پزشک اطلاع دهید. هر گونه اسهال را گزارش کنید. ادامه تب یا ترشحات چرکی در هر محلی را به اطلاع پزشک برسانید.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

سفازولین**(نام تجاری: Kefzol)**

گروه دارویی: سفالوسپورین نسل اول

گروه درمانی: آنتی بیوتیک

شکل دارویی: آمپول(ویال)

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: عفونت های تنفسی , دستگاه ادراری , پوستی , مجاری صفراوی , عفونت خون (سپتی سمی), عفونت دریچه قلبی و پیشگیری قبل از عمل

میزان مصرف: ۲۵۰ تا ۵۰۰ میلی گرم هر ۸ ساعت وریدی یا ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلی گرم هر ۶ تا ۸ ساعت عضلانی

موارد مانع: حساسیت شدید به گروه پنی سیلین ها

عوارض جانبی: واکنش حساسیت , عوارض کلیوی , عوارض خونی , توهم , تشنج

توجهات: بیمار بعد از مصرف سفالوسپورین مستعد خونریزی می شود.

آموزش: هر گونه خون شدن را به پزشک اطلاع دهید. هر گونه اسهال و علائم عفونت ثانویه را اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

سفالکسین**(نام تجاری: Keflex)**

گروه دارویی: سفاوسپورین نسل اول

گروه درمانی: آنتی بیوتیک

شکل دارویی: کپسول و شربت

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: عفونت های تنفسی ، عفونت های گوش میانی ، عفونت های پوستی استخوان و مفاصل و عفونت ادراری - تناسلی
میزان مصرف: روزانه ۱ تا ۴ گرم : هر ۶ ساعت ۲۵۰ تا ۵۰۰ میلی گرم معمول است.

موارد مانع: حساسیت شدید به پنی سیلین ها

عوارض جانبی: آلرژی ، کهیر ، اسهال ، خارش

توجهات: در صورت مصرف طولانی مدت عملکرد کلیه و کبد کنترل شود. بیمار از نظر واکنش آلرژیک مانند خارش و کهیر بررسی شود.

آموزش: هر گونه علائم نشان دهنده حساسیت را به پزشک اطلاع دهید. دارو را در ساعات معین مصرف کنید.

شرایط نگهداری: کپسول را در یخچال نگهداری کنید و پودری را که با مایع حل شده است را فقط ۱۴ روز می توان در یخچال نگهداری کرد.

فنی توئین**(نام تجاری: Dilantin)**

گروه دارویی: هیدانتوئین ها

گروه درمانی: ضد تشنج

شکل دارویی: شربت ، کپسول، آمپول

مصرف در دوران حاملگی: گروه D

موارد مصرف: تشنج ، بی نظمی های ریتم قلبی (آریتمی) ، تشنج در حاملگی ، سکسکه مقاوم

میزان مصرف: در انواع صرع متفاوت است.

موارد مانع: حساسیت شدید دارویی، اختلال قلبی (بلوک قلبی)، نارسایی کبدی

عوارض جانبی: تزریق عضلانی آن به علت درد و آسیب محل تزریق توصیه نمی شود. مهار توانایی مغز و کاهش فشار خون ، سردرد ، کاهش اشتها

توجهات: بدون تجویز پزشک نباید مصرف شود. جا به جایی دارو های ضد تشنج باید طبق دستور پزشک انجام شود.

آموزش: شربت را قبل از مصرف به خوبی تکان دهید. این دارو باعث خواب آلودگی می شود.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

نکته: کامپاند آن ترکیب فنی توئین و فنوباربیتال می باشد. نوع کرم موضعی آن در زخم بستر ، خراش پوستی و آبسه های بزرگ مفید است.

شرایط نگهداری: شیاف باید در یخچال و بقیه اشکال دارویی در دمای ۱۵ تا ۳۰ درجه و دور از نور نگهداری شود.
نکته: در حاملگی و شیر دهی عارضه خاصی گزارش نشده است

فنوباریتال

(نام تجاری: Sifoten)

گروه دارویی: باربیتورات ها
گروه درمانی: ضد تشنج
شکل دارویی: قرص و تزریقی
مصرف در دوران حاملگی: گروه D

موارد مصرف: درمان تشنج (صرع)، تشنج نوزادی یا تشنج به دنبال ضربه، تشنج زمان حاملگی و به عنوان بی حس کننده موضعی

میزان مصرف: در کنترل تشنج ۱۵ تا ۲۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم طی ۱۰ تا ۳۰ دقیقه انفوزیون شود.

موارد مانع: حساسیت شدید دارویی، نارسایی کلیه و کبد، پورفیری

عوارض جانبی: اختلال هوشیاری، خواب آلودگی، اختلال خونی، ضایعات حساسیتی موضعی، سردرد، بی قراری، اضطراب
توجهات: کاهش فشار خون و اختلال تنفس و افزایش ضربان قلب جزء علامت مسمومیت است. قرص نباید جویده شود.
آموزش: نوع تزریقی برای افرادی استفاده می شود که قادر به استفاده خوراکی نیستند.
شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

فلومازنیل

(نام تجاری: Anexate)

گروه دارویی: گروه بنزودیازپین ها (ایمیدازو)
گروه درمانی: ضد بنزودیازپین ها
شکل دارویی: تزریقی ۰,۵ میلی گرم
مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: درمان مسمومیت با بنزودیازپین ها (ضد دیازپام) و در آنسفالوپاتی کبدی مفید است.

میزان مصرف: ۰,۲ میلی گرم وریدی و تکرار در طول یک دقیقه بعد (میزان معمول ۰,۶ تا ۱ میلی گرم).

موارد مانع: حساسیت شدید دارویی، مسمومیت با داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای

عوارض جانبی: تهوع، استفراغ، سردرد، سرگیجه، تشنج، بی نظمی ریتم قلب، لرزش دست و پا، خواب آلودگی، اختلال
بینایی، خستگی، ضایعات پوستی

توجهات: بیمار می بایست از نظر عملکرد کبدی بررسی شود. محل تزریق ممکن است درد ناک باشد. در زمان مصرف ممکن
است تشنج رخ دهد، امکانات لازم را آماده نمایید.

آموزش: بعد از دریافت دارو، از رانندگی اجتناب کنید. از مصرف داروهای اعصاب و روان یا الکل بعد از فلومازنیل خودداری شود.
شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.

فنتانیل**(نام تجاری: Sublimaze)**

گروه دارویی: مشتقات فنیل پیریدین

گروه درمانی: ضد درد و کمک بیهوشی

شکل دارویی: تزریقی

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: قبل از بیهوشی

میزان مصرف: متفاوت است ولی ۵۰ تا ۱۰۰ میکروگرم عضلانی نیم ساعت قبل از بیهوشی، در بیهوشی موضعی و عمومی نیز کاربرد دارد.

موارد مانع: حساسیت شدید دارویی، بیماری میاستنی گراویس

عوارض جانبی: توقف تنفسی، سفتی عضلات، کاهش ضربان قلب

توجهات: مراقبت از تنفس در پایان عمل باید صورت گیرد.

آموزش: مورد خاصی وجود ندارد ولی پس از ۳ تا ۵ روز مصرف دارو احتمال وابستگی دارویی وجود دارد.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.

کاپتوپریل**(نام تجاری: Capoten)**

گروه دارویی: مهار کننده تبدیل کننده آنژیوتانسین

گروه درمانی: کنترل فشار خون و گشاد کننده عروق

شکل دارویی: قرص ۲۵ و ۵۰ میلی گرمی

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: فشار خون، نارسایی قلب، اختلال عملکرد بطن چپ قلب، ضایعات کلیوی، دیابت قندی

میزان مصرف: ۱۲.۵ تا ۲۵ میلی گرم و بار در روز

موارد مانع: حساسیت شدید دارویی و سابقه بروز حساسیت (آنژیوادم)

عوارض جانبی: کاهش فشار خون، اختلال در حس چشایی، سرگیجه، مشکل خونی

توجهات: بیمار ممکن است دچار مشکلات خونی شود آزمایش ضروری است.

آموزش: دارو را یک ساعت قبل از غذا مصرف کنید. در هنگام مصرف بار اول تا ۳ ساعت پس از مصرف در بستر بخوابد. در

صورت بروز ضایعات جلدی و تورم گلو و دست و پا به پزشک مراجعه شود.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

کاربامازپین**(نام تجاری: Tegretol)**

گروه دارویی: مشتق ایمینوستیلین

گروه درمانی: ضد تشنج و دردهای عصبی

شکل دارویی: قرص ۲۰۰ و ۴۰۰ میلی گرمی

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: تشنج (جنرالیزه) و دردهای عصبی سه شاخه (V) (تریژمینال)

میزان مصرف: حداقل ۱۰۰ میلی گرم ۲ بار در روز

موارد مانع: بیماران با حساسیت شدید دارویی، بیماران با سابقه مهار و نارسایی مغز استخوان

عوارض جانبی: سرگیجه، کهیر، اسهال، زخم و التهاب زبان، اختلال خونی

توجهات: قبل از شروع درمان با این دارو تست های خونی، کلیوی و کبدی به عمل آید. میزان بالای دارو باعث بی نظمی عملکرد ریتم قلبی می شود.

آموزش: دارو بهتر است همراه با غذا مصرف شود. از رانگی اجتناب شود. در افراد سالمند با احتیاط مصرف شود.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

کلرفنیر آمین مالئات**(نام تجاری: Chlor-Trimeton)**

گروه دارویی: الکیل آمین

گروه درمانی: ضد حساسیت، بی حس کننده موضعی

شکل دارویی: قرص و تزریقی

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: درمان علامتی حساسیت ها، کهیر، آنژیوادم، آب ریزش و بیماری های التهابی پوستی

میزان مصرف: ۴ میلی گرم هر ۴ تا ۶ ساعت و نوع تزریقی ۱۰ تا ۲۰ میلی رگم تزریق شود.

موارد مانع: حساسیت به آنتی هیستامین ها ولی در آسم با احتیاط مصرف شود.

عوارض جانبی: خواب آلودگی، گیجی، خشکی دهان، مشکلات خونی و گوارشی

توجهات: در افراد با زخم معده، آب سیاه چشم و احتباس ادراری با احتیاط مصرف شود.

آموزش: این دارو را می بایست به میزان کمتری در سالمندان استفاده کرد. رانگی بعد از مصرف دارو ممنوع است. مصرف همزمان

داروهای خواب آور ممنوع می باشد. از مایعات کافی استفاده شود.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی اتاق نگهداری شود.

کتامین**(نام تجاری: Ketalar)**

گروه دارویی: فن سیکلیدین

گروه درمانی: بیهوشی

شکل دارویی: تزریقی

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: دارو در بیهوشی بدون شلی عضلات (با دارو های دیگر و یا بدون دارو های دیگر) به کار می رود.

میزان مصرف: بر حسب مورد برای بیهوشی یا آرام کردن یا ایجاد آثار ضد درد فرق میکند.

موارد مانع: حساسیت شدید دارویی , افراد دارای حملات مغزی یا فشار خون بالا

عوارض جانبی: تغییر رفتار , افزایش توان عضلات , توهم , افزایش فشار خون و تعدا ضربان قلب , تهوع , استفراغ , سردرد پس از بیهوشی از آن جمله اند.

توجهات: با اتر و هالوتان و دارو های مهار کننده مغز و اعصاب تداخل دارویی دارد. کاهش عملکرد تنفسی و افزایش ترشحات حلق از جمله علائم مسمومیت دارویی محسوب می شود.

آموزش: به علت عوارض بعد از عمل از عمل ت مدت کوتاهی از رانندگی و کارهای دقیق و نیازمند توجه خودداری شود. شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.

کلسیم کلونوات**(نام تجاری: Kalciunate)**

گروه دارویی: جایگزین کلسیم

گروه درمانی: اختلالات الکترولیتی

شکل دارویی: قرص و آمپول

مصرف در دوران حاملگی: گروه A

موارد مصرف: درمان کمبود کلسیم حاد , بالا بودن پتاسیم , بالا بودن منیزیم , ایست قلبی

میزان مصرف: روزانه ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلی گرم خوراکی

موارد مانع: بالا بودن کلسیم خون و سنگ کلیوی

عوارض جانبی: یبوست , خشکی دهان , بی اشتهایی

توجهات: در صورت مشاهده رسوب دارو را تزریق نکنید.

آموزش: در صورت ناراحتی گوارشی نیم ساعت بعد از غذا دارو را مصرف کنید. مصرف اسفناج , شیر و لبنیات همزمان با مصرف دارو جذب کلسیم را کاهش می دهد.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی و در جای خشک نگهداری شود.

گلایین کلامید**(نام تجاری: Daonil)**

گروه دارویی: مشتقات سولفونیل اوره آ

گروه درمانی: ضد دیابت

شکل دارویی: قرص ۵ میلی گرم

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: در درمان دیابت قندی تبپ B یا بزرگ سالی

میزان مصرف: ۱ تا ۶ قرص یک بار در روز

موارد مانع: حساسیت شدید دارویی، حاملگی و وضعیت کتو اسیدوز دیابتی از موارد ممنوعیت است.

عوارض جانبی: سرگیجه، سردرد، بی خوابی، اضطراب، افسردگی، عوارض خونی، کاهش قند خون، ضایعات پوستی

توجهات: قند خون بیمار دقیقاً کنترل شود. رژیم های خاص به بیمار داده شود.

آموزش: بیمار همواره کارت یا نسخه پزشک مبنی بر اینکه دچار بیماری قند است را در جیب یا کیف خود داشته باشد. در صورت بروز ضعف شدید یا تعریق یا کرخ شدن دست و پا به پزشک اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود

لیدوکائین هیدروکلراید**(نام تجاری: Xylocaine)**

گروه دارویی: مشتقات آمیدها

گروه درمانی: بی حس کننده موضعی

شکل دارویی: تزریقی، پماد

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: بی حس کننده منطقه ای، بلوک اعصاب محیطی و بلوک عصب سمپاتیک در بی حسی های نخاعی (اسپینال) و ترکیبات مخدر و آریتمی قلبی.

میزان مصرف: بنا بر ضرورت متفاوت است.

موارد مانع: حساسیت شدید دارویی، این دارو با داروهای ایندرال، سایمتدین، فنی توفین، باربیتورات ها، دیورتیک ها و مهار کننده های مغز و اعصاب تداخل دارویی دارد.

عوارض جانبی: تهوع، استفراغ، تشنج، انقباض مردمک

توجهات: تجویز مقدار زیاد آن باعث تشنج می شود.

آموزش: در مصرف دندانپزشکی بلع غذا را مختل می کند.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

نکته: این دارو با اپی نفرین، پریلوکائین مخلوط هم می شوند.

متوکلوپرامید**(نام تجاری: Plasil)**

گروه دارویی: پاراسماتومیمیتیک

گروه درمانی: ضد تهوع ، ضد استفراغ

شکل دارویی: قرص ، آمپول و قطره

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: برگشت اسید معده به مری ، درمان یا پیشگیری از استفراغ و استفراغ شیمی درمانی

میزان مصرف: یک قرص هر ۸ ساعت

موارد مانع: خونریزی ، انسداد روده ، تشنج

عوارض جانبی: علائم پارکینسون ، سردرد ، بی خوابی ، تشنج ، توهم ، اسهال ، تکرار ادرار ، علائم چشمی و مغزی

توجهات: در صورت تکرار تزریق باید دارو رقیق شود. رنگ دارو قبل از تزریق نباید عوض شود.

آموزش: رانندگی بعد از مصرف دارو خطر ناک است.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود

مولتی ویتامین**(نام تجاری:)**

گروه دارویی: مولتی ویتامین

گروه درمانی: مکمل غذایی

شکل دارویی: قرص ، کپسول ، شربت

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: این دارو حاوی ویتامین های **A, D, E, B1, B2, B6, B12** و نیکوتینیک اسید ، ویتامین C ، کلسیم و بیوتین است.

میزان مصرف: یک قرص روزانه یا ۵ سی سی شربت یا یک کپسول

موارد مانع: مورد خاصی وجود ندارد.

عوارض جانبی: مصرف خودسرانه ویتامین ها ممنوع است . زیرا میزان بالای آن پر عارضه خواهد بود.

توجهات: کودکان با سوء تغذیه ، مادران باردار و شیرده نیاز به برنامه خاص دارند.

آموزش: طبق دستور پزشک دارو مصرف شود.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

نکته: دو نوع مولتی ویتامین به همراه آهن یا املاح ، ترکیب مشابه است.

مانیتول**(نام تجاری: Austra)**

گروه دارویی: دیورتیک ها (ادرار آور ها)

گروه درمانی: ضد گلوکوم (آب سیاه چشم)

شکل دارویی: تزریقی ۱۰ یا ۲۰ درصد

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: در ایجاد ادرار بیشتر (دیورزاسموتیک) ، در نارسایی حاد کلیه ، برای کاهش فشار داخل جمجمه ، میوگلوبینوری ناشی از سوختگی (برق گرفتگی) در اثر برق گرفتگی ناشی از سلول های خونی از طریق ادرار دفع می شوند. میزان مصرف: بر حسب مورد متفاوت است.

موارد منع: حساسیت شدید دارویی ، ادم ریوی ، نارسایی قلبی و کمبود مایعات در بدن (دهیدراتاسیون)

عوارض جانبی: اسهال ، تشنج ، سردرد ، سرگیجه ، نارسایی قلبی ، درد قفسه سینه ، تاری دید ، تشنگی ، تهوع ، کهیر ، کاهش یا افزایش فشار خون

توجهات: علائم حیاتب بیمار باید کنترل شود. وزن و عملکرد کلیه بیمار کنترل شود.

آموزش: در صورت درد سینه یا سردرد شدید به پزشک اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

متادون**(نام تجاری: Dolophine)**

گروه دارویی: دی فنیل هپتان

گروه درمانی: ضد درد ، مخدر صنعتی

شکل دارویی: قرص و آمپول

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: در شدید ، سندرم محرومیت از مخدر ها

میزان مصرف: ۲,۵ تا ۱۰ میلی گرم هر ۳ تا ۴ ساعت

موارد منع: در حساسیت شدید دارویی ، مامایی (حین زایمان)

عوارض جانبی: مهار تنفسی ، خواب آلودگی ، تحریکات موضعی بیوست

توجهات: بهتر است دارو عضلانی (IM) تزریق شود. احتمال کاهش فشار خون وجود دارد.

آموزش: بیوست ، خشکی دهان ، خواب آلودگی محتمل است.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود

مترونیدازول**(نام تجاری: Flagyl)**

گروه دارویی: نیترو ایمیدازول
گروه درمانی: ضد باکتری، ضد آمیب
شکل دارویی: شربت، تزریقی
مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: عفونت های میکروبی (بی هوازی)، اسهال خونی، اندوکاردیت، عفونت شکمی
میزان مصرف: ۱۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم طی یک ساعت به عنوان میزان اولیه و ۷,۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم طی ۶ ساعت و حداکثر مصرف ۲۴ ساعت ۴ گرم می باشد.
موارد مانع: حساسیت شدید دارویی، اختلالات خونی یا بیماری مغز

عوارض جانبی: مشکلات کبدی و کلیوی، تهوع، احساس سوزش مجاری ادراری، سرگیجه، سنکوپ، ضایعات پوستی، کهیر
توجهات: آزمایشهای خونی باید انجام شود. این دارو با لیتیوم تداخل دارد. تزریق وریدی این دارو باید به آهستگی انجام شود.

آموزش: بهتر است دارو با معده خالی مصرف شود. در عفونت زنان با میکروب (تریکوموناس) می بایست همسر وی نیز درمان شود. تشنج و علائم منگی نشانه مسمومیت بیمار است. به پزشک مراجعه شود.
شرایط نگهداری: محلول مترونیدازول به مدت سه شبانه روز قابل نگهداری در دمای معمولی است.

مورفین**(نام تجاری: Atramorph)**

گروه دارویی: فنانترین
گروه درمانی: مخدر، ضد درد
شکل دارویی: قرص و تزریقی
مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: در دردهای خفیف تا متوسط، القای بیهوشی، ادم حاد ریه
میزان مصرف: ۱۰ میلی گرم هر ۴ ساعت
موارد مانع: در نارسایی تنفسی، انسداد راه هوایی، حساسیت شدید دارویی، اختلالات تشنجی، ضربات سر، ضربه مغزی (اختلال هوشیاری)، آسم
عوارض جانبی: استفراغ، تهوع، خواب آلودگی، خارش، مهار تنفسی، شوک، کوما، احتباس ادراری، بی قراری، کاهش فشار خون
توجهات: در افراد سالمند میزان دارو باید کاهش یابد.
آموزش: توقف تنفسی، شلی شدید عضلات و کاهش فشار خون علائم مسمومیت اند و باید به پزشک اطلاع داده شود.
شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

متفورمین**(نام تجاری: Glucophage)**

گروه دارویی: بی گوانیدها
 گروه درمانی: ضد دیابت
 شکل دارویی: قرص ۵۰۰ میلی گرمی
 مصرف در دوران حاملگی: گروه B
 موارد مصرف: دیابت قندی (تیب II)
 میزان مصرف: یک قرص ۲ بار در روز
 موارد منع: در افراد حساس، بیماران با نارسایی کلیه
 عوارض جانبی: تهوع، استفراغ، بی اشتها، کم خونی، ضایعات جلدی
 توجیهات: این دارو با استروژن، ایزونیازید و ضد بار داری خوراکی تداخل دارویی دارد. قند خون بیمار باید کنترل شود.
 آموزش: بهتر است متفورمین یا صبحانه یا شام میل شود. بیماران دچار قند باید شناسنامه یا کارتی را که نشانگر بیماری آنهاست همیشه همراه داشته باشند.
 شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود

میدازولام**(نام تجاری: Dormicum)**

گروه دارویی: بنزودیازپین ها
 گروه درمانی: آرام بخش، داروی کمکی در بیهوشی
 شکل دارویی: تزریقی
 مصرف در دوران حاملگی: گروه D
 موارد مصرف: آرام بخش، کاهش اضطراب، نگهداری و کمک بیهوشی عمومی، درمان تشنج، سکسکه مقاوم به درمان
 میزان مصرف: ۰٫۷ تا ۰٫۸ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم - در تزریق عضانی، ۰٫۳ تا ۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم به صورت وریدی
 موارد منع: حساسیت شدید دارویی، گلوکوم زاویه باریک، شوک، کوما، مسمومیت حاد با الکل، نارسایی کلیه
 عوارض جانبی: توقف تنفسی مهمترین عارضه میباشد. راش، تحریک پذیری، بی قراری، لارنگواسپاسم (اسپاسم مجاری هوایی)، سردرد، تندی تنفس، لکنت، تاری دید، اختلال چشمی، اختلال تعادل
 توجیهات: میزان تجویز دارو در سنین بالا (سالمدان) و اطفال باید پایین تر باشد. تزریق عضلانی دارو باید عمیق باشد.
 آموزش: اختلالات روانی و حرکتی بعد از دارو محتمل است. تا ۲۴ ساعت بعد از دریافت دارو بیمار نباید به کارهای دقیق مشغول باشد یا رانندگی کند.
 شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

متیل پردنیزولون**(نام تجاری: Depomedrol)**

گروه دارویی: گلوکوکورتیکوئید

گروه درمانی: ضد التهاب

شکل دارویی: تزریقی

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: به عنوان داروی ضد التهاب در رماتیسم، نفریت لوپسی و حساسیت های شدید

میزان مصرف: ۲۰ تا ۲۰۰ میلی گرم - بسته به درد یا التهاب مفاصل متفاوت است.

موارد ممانع: حساسیت شدید دارویی، عفونت های قارچی و نوزادان نارس

عوارض جانبی: بی خوابی، آتروفی (لاغری) موضعی پوست

توجهات: تزریق عضلانی نوع استات باید عمیق باشد. نوع استات برای مشکلات حاد مفید نیست.

آموزش: قطع ناگهانی دارو می تواند خطرناک باشد.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

نیتروگلیسرین**(نام تجاری: Nitrocontin)**

گروه دارویی: نیترات ها

گروه درمانی: ضد درد قلبی، ضد فشار خون

شکل دارویی: قرص، تزریقی، اسپری، پماد

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: در درمان و پیشگیری از درد های قلبی (آنژین قلبی)، در نارسایی مزمن قلب، آنفارکتوس حاد میوکارد، اسپاسم

منتشر ریه، فشار خون حاملگی

میزان مصرف: میزان مصرف قرص: یک قرص زیر زبانی و تکرار آن ۵ دقیقه بعد ولی پماد آن ۲ تا ۳ بار در روز بر روی سینه

مالیده شود.

موارد ممانع: حساسیت شدید دارویی، کاهش فشار خون، کم خونی شدید، بالا بودن فشار داخل مغزی

عوارض جانبی: سردرد، تهوع، بی قراری، خستگی، رنگ پریدگی، در پماد خارش و تاول جزء عوارض موضعی است.

توجهات: علائم حیاتی بیمار را کنترل کنید. در صورت تهوع، تعریق یا کاهش فشار خون به فکر مسمومیت دارویی باشید.

آموزش: قرص نیتروگلیسرین را با معده خالی مصرف کنید. از قطع ناگهانی دارو پرهیز کنید.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

نالوکسان**(نام تجاری: Narcan)**

گروه دارویی: اکسی مورفون

گروه درمانی: ضد اپیوئید ها - ضد مخدر ها

شکل دارویی: تزریقی

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: تشخیص و درمان مسمومیت ها با مواد مخدر یا کومای ناشی از آن ، درمان مهار تنفسی بعد از جراحی ، خارش ناشی از انسداد صفراوی

میزان مصرف: ۰.۴ تا ۲ میلی گرم وریدی یکجا تزریق می شود.

موارد مانع: در افرادی که وابستگی شدید به مخدر ها دارند، با احتیاط استفاده شود.

عوارض جانبی: تهوع ، استفراغ ، اختلال تمرکز و حواس ، بی اشتها ، تغییرات فشار خون
توجهات: این دارو اغلب در مراکز اورژانس و بیمارستانی تزریق می شود.

آموزش: مورد خاصی مطرح نیست.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

نورتزپتیلین**(نام تجاری: Arentyl)**

گروه دارویی: ضد افسردگی سه حلقه ای

گروه درمانی: ضد افسردگی

شکل دارویی: قرص و کپسول

مصرف در دوران حاملگی: گروه D

موارد مصرف: ضد افسردگی ، ضد ترس روانی (پانیک)، دردهای عصبی ، شب ادراری، سردرد میگرنی

میزان مصرف: با ۲ قرص روزانه شروع و طی ۳ هفته آن را افزایش دهید.

موارد مانع: حساسیت شدید دارویی

عوارض جانبی: آریتمی قلبی (بی نظمی های ریتم قلب) ، شوک ، بلوک قلبی ، خواب آلودگی ، بیبوست ، احتباس ادرار ، کاهش میل جنسی ، تهوع ، تعریق ، تاری دید.

توجهات: دارو ها همراه یا بلافاصله بعد از غذا مصرف شوند . **CBC** (شمارش کلبول های خون) و عملکرد کلیه و قلب باید بررسی شود.

آموزش: دارو ها همراه یا بلافاصله بعد از غذا مصرف شوند . احتباس ادرار - خشکی دهان یا بیبوست را به بیمار متذکر شوید.
ممکن است رنگ ادرار به آبی یا متمایل به سبز تغییر یابد. حتی الامکان به بیمار توصیه شود در هنگام خروج از منزل از عینک آفتابی استفاده کند.

شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.

وانکومايسين**(نام تجاری: Vancocin)**

گروه دارویی: گلیکوپپتید

گروه درمانی: آنتی بیوتیک

شکل دارویی: تزریقی و محلول خوراکی

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: عفونت های متوسط ، بی هوازی ، گاز کانگرن ، عفونت استخوانی ، عفونت پوستی و روده ای، عفونت ریوی و پرده مغزی

میزان مصرف: ۴۵ تا ۶۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم در روز

موارد مانع: حساسیت شدید دارویی ، اختلالات شنوایی و نارسایی کلیوی

عوارض جانبی: عوارض شنوایی و کلیوی، تهوع ، کاهش فشار خون ، اختلالات خونی ، درد محل تزریق، تشنج
توجهات: در نارسایی کلیه باید میزان آن را کاهش داد. انفوزیون وریدی آن باید به مدت یک ساعت طول بکشد. بهتر است به شکل عضلانی تزریق شود.

آموزش: سابقه حساسیت دارویی را به پزشک بگویید. علائم سرگیجه و وز وز گوش را به اطلاع پزشک برسانید.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.

وارفارین**(نام تجاری: Coumadin)**

گروه دارویی: مشتقات کومارین

گروه درمانی: ضد انعقاد

شکل دارویی: قرص ۲،۵ و ۵ میلی گرمی

مصرف در دوران حاملگی: گروه X

موارد مصرف: پیشگیری از لخته شدن دارو در ورید های عمقی (ترومبوز ورید عمقی DVI) بعد از انفارکتوس میکارده (سکتانه قلبی) حملات گذرای مغزی

میزان مصرف: ۵ تا ۱۰ میلی گرم یک بار در روز به مدت ۲ تا ۴ روز و تداوم آن با نظر متخصص

موارد مانع: خونریزی حاد ، زنان حامله ، نارسایی کلیه ، کبد ، فشار خون بالا، جراحی نخاع و چشم و مغز ، در اختلالات خونی و حساسیت شدید دارویی

عوارض جانبی: تب، درد شکم ، تهوع ، استفراغ ، مدفوع قیری، زردی ، ضایعات جلدی

توجهات: در طول درمان می بایست PT (تست انعقادی) بیمار به ۱،۵ تا ۲ برابر میزان کنترل برسد.

آموزش: دارو را بدون نظر پزشک قطع نکنید. در صورت اسهال یا مدفوع قیری سیاه رنگ به پزشک اطلاع دهید.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.

هالوپریدول**(نام تجاری: Haldol)**

گروه دارویی: بوتیروفنون ها

گروه درمانی: ضد سایکوز (اختلالات شدید روانی)

شکل دارویی: قرص و تزریقی

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: اختلالات سایکوز در نوع حاد و مزمن ، اضطراب شدید در بیماری اوتیسم افعال ، در استفراغ های شدید و در دیس تونی اندام ها

میزان مصرف: ۱ تا ۵ قرص ۰,۵ میلی گرم حداکثر ۱۰۰ میلی گرم روزانه

موارد مانع: حساسیت شدید دارویی ، در بیماران دو قطبی باعث افسردگی می شود.

عوارض جانبی: خشکی دهان ، خواب آوری ، تشنج ، آریتمی قلب ،

توجهات: تزریق هالوپریدول باید به صورت عمقی و باسوزن شماره ۲۱ انجام شود. (فقط به صورت عضلانی تزریق شود).

آموزش: از رانندگی و کارهای دقیق خودداری کنید. استفاده از الکل و دارو های خواب آور همزمان اجتناب شود. خشکی دهان از عوارض شایع است، مایعات بیشتر مصرف شود. بیمار باید در انجام آزمایشهای حین مصرف دارو همکاری کند. بیمار نباید در سرما و گرمای شدید قرار بگیرد.

شرایط نگهداری: در جای خشک و دور از نور نگهداری شود.

هیدروکلروتیازید**(نام تجاری: Esidrex)**

گروه دارویی: دیورتیک

گروه درمانی: ضد فشار خون ، ضد سنگ سازی در کلیه ها

شکل دارویی: قرص

مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: در درمان فشار خون ، اختلالات کبدی ، نارسایی کلیه ، ادم عمومی ، قبل از قاعدگی

میزان مصرف: نصف تا یک قرص کامل و در صورت نیاز به میزان ۲ قرص در روز قابل افزایش است.

موارد مانع: حساسیت شدید دارویی ، عدم توانایی بیمار در ادرار کردن (آنوری)

عوارض جانبی: زردی ، از دست رفتن آب بدن ، نارسایی کلیه ، ترومبوسیتوپنی ، اگرالوسیتوز ، کاهش میل جنسی ، ضایعات جلدی ، پر ادراری - شب ادراری

توجهات: وزن و فشار خون بیمار را کنترل کنید. تهوع ، استفراغ ، و ضعف عمومی و تشنج احتمال مسمومیت را مطرح می کند.

آموزش: دارو باعث کاهش فشار خون می شود. تغییر وضعیت را در نظر بگیرید. دارو با غذا میل شود.

شرایط نگهداری: در جای خشک و دور از نور نگهداری شود.

نکته: بیمار مستعد حساسیت به نور می شود.

هیوسین**(نام تجاری: Buscopan)**

گروه دارویی: آنتی کولینرژیک

گروه درمانی: ضد اسپاسم

شکل دارویی: قرص , شیاف , تزریقی

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: درمان کمکی در زخم معده , اسهال , درد اسپاسمی , زخم روده بزرگ , در بیماری حرکت , ضد استفراغ , بی اختیاری ادراری و درد قاعدگی

میزان مصرف: ۲ قرص ۴ بار در روز در درد های ماهانه زنان از ۲ روز قبل از قاعدگی شروع و ۳ روز بعد از آن ادامه یابد.

موارد منع: حساسیت شدید دارویی

عوارض جانبی: خشکی دهان

توجهات: این دارو به کاهش درد شکمی و علامتی بیماران به ویژه اسهال کمک می کند.

آموزش: مصرف خودسرانه دارو می تواند خطرناک باشد. در درد های شکمی مداوم بدون مجوز پزشک مصرف نشود. در اسهال خونی و عفونی نباید استفاده شود.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.

هپارین سدیم**(نام تجاری: Liquaemin)**

گروه دارویی: موکوپلی ساکاراید

گروه درمانی: ضد انعقاد

شکل دارویی: تزریقی

مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: پروفیلاکسی (پیشگیری) و درمان لخته های وریدی عمقی به ویژه در اندام های تحتانی , درمان آنژین قلبی ناپایدار و درمان کمکی در انفارکتوس میوکارد , تشخیص و درمان انعقاد منتشر داخل عروقی (DIC)

میزان مصرف: در پیشگیری با میزان پایین دارو همراه است ۳۰۰ واحد به ازای هر کیلوگرم وزن بدن , در حملات مغزی ۳ تا ۵ هزار واحد وریدی و به دنبال آن ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ واحد در هر ساعت

موارد منع: خونریزی شدید , کاهش تعداد پلاکت , در هموفیلی یا بیماری کبد ممنوع است.

عوارض جانبی: خونریزی , درد خفیف , تب , خارش

توجهات: در مسمومیت شدید , خونریزی علامت بارزی است معمولاً با قطع دارو بهبود می یابد. در صورت عدم بهبودی از داروی پروتامین سولفات استفاده کنید. تزریق وریدی هپارین بر نوع زیر جلدی یا عضلانی ارجح است.

آموزش: در صورت خونریزی یا ضایعات جلدی (پوست) به پزشک اطلاع دهید. در صورت فراموشی یک وعده دارو , میزان ۲ برابر آن در وعده بعدی پرهیز کنید.

شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.