



محتوای آموزشی

مسمومیت با الکل های شایع

- هدف کلی
- اهداف رفتاری
- مسمومیت با اتانول
- علایم و نشانه ها
- اندیکاسیون های بستری
- چگونگی تمایز مسمومیت اتانول از متانول
- مسمومیت با متانول
- علایم بالینی

منابع:

سایت up todate

هدف کلی:

اهداف رفتاری:

مسمومیت با اتانول

۱

شایع ترین ماده سو مصرفی در جهان است. شکل خالص آن به صورت مایعی شفاف و بیرنگ با بو و مزه تند و اندکی فرار می باشد. اتانول علاوه بر مشروبات الکلی در فرآورده های خانگی نظیر دهان شویه-ادکلن ها وجود دارند. جذب اتانول سریع است بطوری که حدود ۸۵٪ از دوز الکل خورده شده در طی ۶۰ دقیقه جذب می شود.

مصرف الکل با معده خالی با همراه با داروهای افزایش دهنده حرکات دستگاه گوارش سبب افزایش سرعت جذب شده و پر بودن معده به ویژه مصرف غذاهای چرب و داروهای کاهنده حرکات دستگاه گوارش و الکل های با غلظت بالا جذب را به تأخیر می اندازد. الکل پس از جذب به صورت یکنواخت در مایعات بدن منتشر شده و از سد خونی مغزی نیز عبور کرده و تأثیر خود را برروی مغز می گذارد.

- تغییرات خلقی
- رفتاری
- شخصیتی
- لکنت زبان
- کما
- مشکل تنفسی

چشمی:

- اختلال بینایی
- دوبینی

گوارشی:

- تهوع
- استفراغ
- درد شکم

عمومی:

- تعریق
- افزایش ضربان قلب
- کاهش فشارخون
- قرمز شدن صورت

انجام سی تی اسکن: ظرف مدت ۴

اندیکاسیون های بستری

۳

- علایم حیاتی ناپایدار
- افت سطح هوشیاری

چگونگی تمایز مسمومیت اتانول از متانول

۴

متانول	اتانول	
بی بو	بوی مخصوص	بو
تأخیری	سریع	پیدایش علایم
طولانی	کوتاه	مدت مسمومیت



متانول الکل چوب است. در صورت خالص بودن بدون رنگ و بدون بوده و در ضد یخ ها، حلال ها و عطرها و.... کاربرد دارد.

جذب:

به سرعت از مخاط دهان و دستگاه گوارش جذب شده و غلظت های سرمی آن ها پس از آن ها ۳۰ تا ۶۰ دقیقه به حداکثر می رسد و سپس در تمامی مایعات بدن پخش می شود. جذب پوستی و ریوی دارد.

- سردرد
- سفتی گردن
- سرگیجه
- گیجی
- تشنج
- کما

واحد آموزش به بیمار

مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی طالقانی مشهد

