



دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دانشکده پرستاری و مامایی



مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی طالقانی

قرص کلوییدوگرل (پلاویکس یا اسویکس)

ضد انعقاد خوراکی



تهیه و تنظیم: واحد آموزش سلامت

کد سند: ۰۰۹

تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۲/۱۰/۰۱

شماره بازنگری: ۱۴۰۵/۱۰/۰۱

عنوان سند: پمفلت آموزش به بیمار

گروه هدف: بیماران

اگر مصرف پلاویکس را فراموش کردید،

چه کار کنید؟

- * در صورت فراموش کردن مصرف قرص در ساعت معین شده، به محض این که به یاد آوردید، دارو را مصرف کنید.
- * در صورتی که تقریباً نوبت بعدی فرا رسیده است، لازم نیست نوبت فراموش شده را جبران کنید.
- * توجه: مصرف درست و به موقع پلاویکس را فراموش نکنید.



پلاویکس با کدام داروها تداخل دارد؟

- * مصرف همزمان با ایبوبروفن و داروهای مسکن ممنوع است. زیرا باعث افزایش احتمال خونریزی در شما می گردد.
- * امپرازول (کاهنده اسید معده که ناشتا مصرف می شود) باعث کاهش اثر پلاویکس می شود.
- * اگر زخم معده دارید، حتماً با پزشک خود در رابطه با مصرف دارو مشورت کنید.

علائم خطر جهت مراجعه به پزشک چیست؟

- * خونریزی (ادرار، مدفوع قیری یا سیاه رنگ، استفراغ یا سرفه خونی، خونریزی از بینی و...)
- * از دست دادن دید
- * اختلال در تکلم (به سختی صحبت کردن)
- * ضعف یا بی حسی در یک طرف بدن
- * گیجی



اینترنت گوشی خود را روشن کنید
و جهت دیدن مطالب بیشتر این کد
را با دوربین گوشی اسکن نمایید.



منبع علمی:

www.Uptodate.com/Home

جهت پیگیری و سئوالات خود می توانید با "کلینیک
پرستاری آموزش سلامت" تماس حاصل نمایید.
ساعات حضور: ۹-۱۲ روزهای غیر تعطیل
شماره تماس: ۳۵۴۲۳۹۷۰ - داخلی ۸۲۵۵-۸۲۸۷
آدرس: بیمارستان طالقانی- ساختمان درمانگاه
تخصصی طبقه اول

مددجوی عزیز

پمفلت حاضر شامل مطالب آموزشی در مورد بیماری کنونی شما می باشد. امیدواریم با مطالعه و رعایت آن سلامت خود را بازیابید.



پلاویکس چه تأثیری دارد؟

پلاویکس (کلوپیدوگرل) دارویی است که به جلوگیری از چسبیدن پلاکت ها در خون به یکدیگر و عدم تشکیل لخته در خون کمک می کند. پلاکت ها، سلول هایی در خون هستند که نقش کلیدی در ایجاد لخته های داخل عروقی، سکتة های قلبی و مغزی دارند.

چه زمانی پلاویکس تجویز می شود؟

عمده مصرف پلاویکس، در بیماران با مشکلات قلبی عروقی، سابقه حملات قلبی و سکتة مغزی است.

۱. به همراه آسپرین بعد از سکتة قلبی و مغزی: حداقل به مدت یک سال سبب کاهش حملات مجدد قلبی و مغزی می شود.

۲. به عنوان جایگزین آسپرین: در بیماران با سکتة های مغزی، قلبی و بیماری های عروقی که به هر دلیلی قادر به مصرف آسپرین نیستند. مانند حساسیت به آسپرین و سابقه خون ریزی معده.

۳. بعد از بالون زدن و استنت (فنر) گذاری به

همراه آسپرین: میزان انسداد استنت و لخته شدن را به میزان زیادی کاهش می دهد. طول زمان مصرف این دارو، بسته به بیمار، نوع استنت و تعداد استنت حدود سه ماه تا یک سال و گاهی بیشتر است.

پلاویکس حتماً باید با نظر پزشک شروع و قطع شود. هرگز مصرف دارو را به طور ناگهانی قطع نکنید. حتی اگر احساس می کنید حالتان خوب شده است به مصرف قرص طبق دستور ادامه دهید.

پلاویکس را چگونه باید مصرف کنید؟

* پلاویکس را دقیقاً همان طور که دکتر شما تجویز کرده است، مصرف کنید. راهنمایی های بر روی برچسب نسخه خود را خوانده و براساس آن عمل کنید. این دارو را در مقادیر بیشتر یا کمتر از مقدار توصیه شده، مصرف نکنید.

* شما می توانید این دارو را همراه غذا یا با معده خالی مصرف نمایید.

* در صورت مراجعه به دندانپزشک یا پزشک دیگر، مصرف دارو را به اطلاع پزشک برسانید.
* اگر قصد جراحی دارید، باید دارو را یک هفته قبل با نظر پزشک خود قطع نمایید.
* از آنجا که پلاویکس از لخته شدن خون شما جلوگیری می کند، می تواند باعث آسان تر شدن و تشدید خونریزی در شما، حتی به دنبال یک آسیب جزئی شود. بنابراین تا حد امکان از فعالیت های آسیب زا خودداری نمایید.



پلاویکس (کلوپیدوگرل) را طبق دستور پزشک مصرف نمایید.