

در ارتباط با

- ۱- درد، ضعف و خستگی
 - ۲- ترس از بروز اسهال یا تهوع
 - ۳- ترس از بروز درد قفسه سینه و حمله قلبی
 - ۴- عدم تحمل فعالیت بدلیل هایپوکسی بافتی
 - ۵- سوء تغذیه
 - ۶- عدم تمایل به فعالیت به دلیل ترس از افتادن
 - ۷- عدم تمایل به فعالیت به دلیل ترس از جابجا شدن و یا خارج شدن اتصالات
 - ۸- اثرات کاهنده داروهای بیهوشی، مسکن و مخدر، شل کننده عضلانی
 - ۹- پیشرفت فرایندهای ناتوان کننده بیماری
 - ۱۰- اختلالات نوروماسکولار (پارزی و فلج)
 - ۱۱- فقدان حس و حرکت
 - ۱۲- وجود تراکشن
 - ۱۳- آهسته شدن پاسخهای فیزیکی به دلیل روند کهولت سن
 - ۱۴- کاهش تحرک مفصلی و درد مفاصل
- مشخصات:** اختلال حرکت در تخت، اشکال در انتقال و تحرک، محدودیت در حرکات و دامنه حرکتی مفاصل، کاهش قدرت عضلانی، وجود وسایل محدود کننده مثل تراکشن، اختلال در هماهنگی عضلانی و بی میلی به حرکت
- برایند مورد انتظار:**
- بیمار با توجه به محدودیت های حاصل از روشهای درمانی و جراحی، حداکثر فعالیت را داشته باشد.