

در رابطه با

- ۱- ضعف و خستگی
- ۲- ضعف ناشی از کاهش اکسیژناسیون و پرفوزیون بافتی
- ۳- ضعف ناشی از آنمی
- ۴- ضعف ناشی از عدم تعادل الکترولیتی و سوء تغذیه
- ۵- سرگیجه ناشی از هایپوتانسیون وضعیتی
- ۶- حضور لوله ها و ابزارهای محدودکننده بیمار
- ۷- اختلالات حسی و حرکتی
- ۸- سوختگی یا بریدگی حاصل از اختلالات حسی
- ۹- احتمال بروز تشنج
- ۱۰- اثرات کاهنده داروهایی نظیر نارتوتیکها، شل کننده های عضلانی
- ۱۱- ناتوانی یا اشتباه در استفاده از پروتز
- ۱۲- تغییر در مرکز ثقل بدن ناشی از قطع عضو
- ۱۳- کاهش هوشیاری نسبت به آسیبهای محیطی

مشخصات: وجود ریسک فاکتورهایی نظیر: ضعف، کاهش حس بینایی، کاهش حس لامسه و درجه حرارت، اختلال در ایجاد تعامل با محیط، کاهش هماهنگی دست و چشم، کاهش هماهنگی در عضلات کوچک و بزرگ، اختلالات شناختی یا روانی، مسمومیتها

برایند مورد انتظار:

بیمار دچار صدمات حاصل از سقوط، سوختگی و عوارض پاتولوژیک بیماری ها نشود.