

در رابطه با

- ۱- تحریک واگ و یا سمپاتیک در نتیجه تحریک احشاء بدلیل دیستانسیون شکم
- ۲- تحریک واگ و یا سمپاتیک در نتیجه احتقان عروق قلب و مجاری گوارشی
- ۳- تحریک واگ و یا سمپاتیک در نتیجه التهاب پانکراس
- ۴- تحریک شیمیایی مرکز استفراغ در نتیجه مسمومیت دارویی
- ۵- تحریک شیمیایی مرکز استفراغ در نتیجه افزایش سطح سرمی سمومات نیتروژنی
- ۶- تحریک شیمیایی مرکز استفراغ در نتیجه اختلالات الکترولیتی و عدم تعادل اسید-باز
- ۷- تحریک کورتیکال بدلیل ترس، درد و اضطراب
- ۸- افزایش فشار داخل جمجمه
- ۹- بوی خلط و درمان ائروسول ها

مشخصات: احساس ناراحتی در شکم، تمایل به استفراغ، بی اشتها، تعریق، افزایش ترشح بزاق، لرز، رنگ پریدگی، بروز استفراغ

برایند مورد انتظار:

- ۱- بیمار حالت تهوع و استفراغ نداشته باشد.
- ۲- بگوید که حالت تهوع ندارد.
- ۳- استفراغ نداشته باشد.